

# Paracetamol Hasco, 80mg, czopki, lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, 10 czopków



Cena: 7,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco - Lek
Substancja czynna	Paracetamolum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Paracetamol Hasco 80mg - 10 czopków

## (Paracetamolum)

### Opis:

Paracetamol HASCO jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

### Skład:

1 czopek zawiera:

Substancję czynną: paracetamol 80 mg

Substancję pomocniczą: tłuszcz stały (Witepsol S58).

### Dawkowanie:

Ten lek zawsze należy stosować dokładnie tak jak opisano w ulotce dołączonej do opakowania lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Czopki Paracetamol HASCO stosuje się doodbytniczo.

U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobową paracetamolu dla osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 10 dni.

U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała) lub według poniższej tabeli wiekowej.

Dawki jednorazowe

- 3 miesiące-1 rok - 80 mg
- 2-3 lata - 125 mg
- 4-6 lat - 125 mg do 250 mg
- 7-8 lat - 250 mg
- 9-10 lat - 250 mg do 500 mg
- 11-12 lat - 500 mg

W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie więcej niż 4 razy na dobę.

U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat lek należy stosować tylko z przepisu lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Paracetamol HASCO jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

## Wskazania:

Wskazaniami do stosowania leku są **bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe**.

## Działanie:

**Paracetamol HASCO** jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 godzin. Działanie przeciwgorączkowe trwa 6-8 godzin.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku **Paracetamol HASCO**, jeśli występuje:

- nadwrażliwość na paracetamol,
- ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby,
- choroba alkoholowa,
- ciężka niewydolność nerek.

## Działania niepożądane:

Jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

W dawkach leczniczych paracetamol jest stosunkowo mało toksyczny.

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko (

- Zaburzenia układu oddechowego

Rzadko (>1/10 000 do