

Paracetamol Hasco syrop truskawkowy 150 g



Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco Lek
Substancja czynna	Paracetamolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Paracetamol Hasco 120 mg/5ml syrop - 150 g

(Paracetamolum)

SMAK TRUSKAWKOWY

Opis produktu:

Lek **Paracetamol Hasco** zawiesina doustna o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym przeznaczonym do stosowania u niemowląt i dzieci

Składniki:

- Substancja czynna - paracetamol
- Substancje pomocnicze - sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sacharyna sodowa (E 954), sodu benzoatan (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat truskawkowy, woda oczyszczona

5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu

Wskazania:

Wskazaniami do stosowania leku są gorączka i bóle różnego pochodzenia:

- po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów
- bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu) oraz dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy)
- ponadto lek stosuje się u niemowląt od 0 do 3 miesiąca życia do leczenia objawowego gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego

Działanie

- przeciwgorączkowe
- przeciwbólowe

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

lek Paracetamol Hasco stosuje się doustnie. Przed użyciem energicznie wstrząśnij w celu uzyskania jednolitej zawiesiny

jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka paracetamolu wynosi:

- 10 do 15 mg na kilogram masy ciała w razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4-6 godzin, do 4 razy na dobę, czyli maksymalnie 60 mg/kg mc./dobę
- bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni
- stosowanie u dzieci poniżej 2 lat powinno być zlecone przez lekarza

Poniżej podano przykładowy schemat obliczania dawki leku:

Od urodzenia do 3 miesiąca życia (do 4 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 2,5 ml (60 mg),
- maksymalna dawka dobową: 10 ml (240 mg).

Od 4 do 8 miesiąca życia (do 7 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 4 ml (96 mg),
- maksymalna dawka dobową: 16 ml (384 mg).

Od 9 do 11 miesiąca życia (do 8 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 5 ml (120 mg),
- maksymalna dawka dobowo: 20 ml (480 mg).

Od 1 do 2 lat (do 10,5 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 6,5 ml (156 mg),
- maksymalna dawka dobowo: 26 ml (624 mg).

Od 2 do 3 lat (do 13 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 8 ml (192 mg),
- maksymalna dawka dobowo: 32 ml (768 mg).

Od 4 do 5 lat (do 18,5 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 12 ml (288 mg),
- maksymalna dawka dobowo: 48 ml (1152 mg).

Od 6 do 8 lat (do 24 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 15 ml (360 mg),
- maksymalna dawka dobowo: 60 ml (1440 mg).

Od 9 do 10 lat (do 32 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 20 ml (480 mg),
- maksymalna dawka dobowo: 80 ml (1920 mg).

Od 11 do 12 lat (do 45,6 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 28,5 ml (684 mg),
- maksymalna dawka dobowo: 114 ml (2736 mg).

Przeciwwskazania:

Leku Paracetamol Hasco nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub wirusowym zapaleniem wątroby, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,
- w chorobie alkoholowej

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko (mniej niż 1 na 1000 osób):

- skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 osób):

- zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza); nudności, wymioty, biegunka

Lek stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol z powodu ryzyka przedawkowania. W razie przedawkowania natychmiast skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze
- Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 3 dni
- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane
- Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek
- W czasie stosowania leku nie należy pić napojów alkoholowych, nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu. Szczególnie duże ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych. U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas acetylosalicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.
- Dostępne wyniki badań wskazują, że podawanie paracetamolu może stanowić czynnik ryzyka rozwoju astmy oraz chorób alergicznych u dzieci.
- Lek Paracetamol Hasco zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek Paracetamol Hasco zawiera sodu pirosiarczyn, dlatego może rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

- leku nie należy przyjmować wraz z ośrodkowo działającymi środkami przeciwbólowymi ani z alkoholem, ponieważ nasila ich działanie
- w przypadku jednoczesnego stosowania: barbituranów, leków przeciwpadaczkowych (m.in. glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), rifampicyny, wzmacnia się szkodliwe działanie paracetamolu na wątrobę. Paracetamol zwiększa toksyczność chloramfenikolu
- długotrwałe stosowanie paracetamolu w dużych dawkach nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny

- jednoczesne stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. ul. Żmigrodzka 242e 51-131 Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym