

Pedicetamol, 100 mg/ml, krople, 30 ml

Cena: 18,20 PLN



Opis słownikowy

Producent /
Marka Polski Lek-Dystrybucja

Substancja
czynna Paracetamolum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Pedicetamol, 100 mg/ml , krople - 30 ml

(Paracetamolum)

Opis produktu:

Dla niemowląt od 0 miesięcy i dzieci.

Pedicetamol® zawiera paracetamol, który należy do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Skład:

- **Substancja czynna** - paracetamol.
- **Substancje pomocnicze** - makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzyłowy), sacharyna sodowa, azorubina (karmiozyna) (E122) i woda oczyszczona.

1 ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.

Wskazania:

- Lek jest stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Działanie:

Leczenie:

- gorączki,
- bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Zwykle stosuje się ok. 60 mg/kg masy ciała na dobę i dawka jest podawana 4-6 razy na dobę:

- 15 mg/kg mc. co 6 godzin,
- 10 mg/kg mc. co 4 godziny.

Instrukcja podawania leku w dawce 15 mg/kg masy ciała, co 6 godzin (czyli 4 razy na dobę).

Masa ciała, Wiek, Objętość (ml), mg paracetamolu, Ilość kropli:

- do 4 kg - 0-3 miesiące, 0,6 ml, 60 mg, 15
- do 7 kg - 4-8 miesięcy, 1 ml, 100 mg, 25
- do 8 kg - 9-11 miesięcy, 1,2 ml, 120 mg, 30
- do 10,5 kg - 12-23 miesiące, 1,6 ml, 160 mg, 40
- do 13 kg - 2-3 lata, 2 ml, 200 mg, ---
- do 18,5 kg - 4-5 lat, 2,8 ml, 280 mg, ---
- do 24 kg - 6-8 lat, 3,6 ml, 360 mg, ---
- do 32 kg - 9-10 lat, 4,8 ml, 480 mg, ---

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, gorączka nie ustąpi po 3 dniach lub jeśli ból nie ustąpi po 3 dniach u dzieci lub 5 dniach u dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła), należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- złe samopoczucie,
- niedociśnienie,
- zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- uszkodzenie wątroby,
- hipoglikemia,
- mętny mocz,
- zmiany liczby krwinek (neutropenia, leukopenia),
- reakcje skórne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Lek przeznaczony dla dzieci do 32 kg masy ciała.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Pedicetamol może być stosowany w rozcieńczeniu z wodą, mlekiem, sokiem owocowym.

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na badania laboratoryjne:

W przypadku planowanych badań laboratoryjnych należy poinformować lekarza o stosowaniu preparatu.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Pedicetamol może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciwzakrzepowymi,
- lekami przeciwpadaczkowymi,

- węglem aktywowanym,
- lekami spazmolitycznymi stosowanymi w kurczach żołądka, jelit i pęcherza moczowego (leki przeciwcholinergiczne),
- propranololem.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Polski Lek-Dystrybucja Sp. z o.o., Chopina 10, 34-100 Wadowice.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.