

Pedipur, puder leczniczy w kremie, potliwość stóp, dłoni, 0,2 g/g, 60 g



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Poznań
Substancja czynna	Methenaminum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Pedipur - Puder leczniczy 60 g

(Methnaminum)

Opis produktu:

Pedipur - to lek w postaci pudru leczniczego, który stosuje się w nadmiernej potliwości stóp oraz dłoni. Lek dodatkowo hamuje przykry zapach potu.

Skład:

- substancją czynną jest - metenamina (Methenaminum)
- substancje pomocnicze - talk, cynku tlenek, glicerol 86%, woda oczyszczona.

1 g pudru zawiera 200 mg metenaminy.

Wskazania:

- Wskazaniem do stosowania **Pedipur** jest leczenie nadmiernej potliwości stóp i dłoni.

Działanie:

-

Pedipur zawiera jako substancję czynną metenaminę, która uwalnia aldehyd mrówkowy wskutek kontaktu z kwaśnym potem. Ponadto, aldehyd mrówkowy osłabia czynność gruczołów potowych a także hamuje aktywność bakterii, co powoduje mniejsze wydzielanie potu oraz hamuje jego rozkład przez bakterie.

-

Pedipur działa wysuszająco, bakteriobójczo i ściągająco. Likwiduje przykry zapach potu.

Dawkowanie:

- Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Preparat do stosowania miejscowego na skórę.
- Lek stosować nie częściej niż 1 – 2 razy w tygodniu.
- Po uzyskaniu poprawy zabiegi można stosować profilaktycznie co 14-20 dni.
- Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć.
- Przed zastosowaniem leku należy umyć starannie skórę nóg lub dłoni i wysuszyć.
- Nanieść niewielką ilość **Pedipuru** na skórę nóg lub dłoni, wcierać i pozostawić do wyschnięcia.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Nie należy stosować leku **Pedipur**:

- w przypadku nadwrażliwości na metenaminę lub inne składniki leku,
- na błony śluzowe,
- na otwarte rany,
- na powierzchnie ciała pozbawione naskórka,
- na owrzodzenia.

Działania niepożądane:

- Jak każdy lek, Arcalen może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
- Długotrwałe stosowanie leku może spowodować miejscowe odczyny alergiczne skóry nóg i dłoni.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ze względu na ryzyko inaktywacji nie stosować ze środkami:

- o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, azotany),
- kwasami i solami o odczynie kwaśnym (węglan wapnia i magnezu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią podrażnienia, zaczerwienienia skóry. Należy skontaktować się z lekarzem
- Długotrwałe stosowanie leku może spowodować miejscowe odczyny alergiczne skóry nóg i dłoni.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby substancja czynna leku mogła stanowić zagrożenie dla płodu lub przenikała do mleka kobiet karmiących piersią. Jednak wobec braku odpowiednich badań, lek może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko po konsultacji z lekarzem w przypadku przewagi korzyści nad ryzykiem.

- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku, nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.
- Arcalen należy stosować ostrożnie u młodzieży powyżej 12 lat, jeśli rodzice są uczuleni na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae).

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Ze względu na brak danych, przed użyciem leku u dzieci należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Lek przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie, "Herbapol" S.A., Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

Masa netto: 60g.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym