

Pelafen med, 20 mg x 30 tabletek



Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Phytopharm
Substancja czynna	Pelargonium sidoides
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Pelafen Med, 20 mg - 30 tabletek powlekanych

(Pelargonii radicis extractum siccum)

Opis produktu:

Pelafen MED jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania w objawowym leczeniu przeziębienia

Skład:

Jedna tabletką powlekana zawiera:

- 20 mg suchego wyciągu z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzenia pelargonii) – Pelargonii radicis extractum siccum (4-7:1).
- rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 14% (V/V)

Wskazania:

- produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania
- objawowe leczenie przeziębienia

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

- **dzieci 6-12 lat:** 1 tabletką 2 razy na dobę rano i wieczorem
- **dzieci 12+ i dorośli:** 1 tabletką 3 razy na dobę rano, w południe i wieczorem
- połykać w całości, popijając niewielką ilością wody
- nie rozgryzać

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 6 lat.

Jeśli mimo stosowania leku objawy nasilą się lub nie ustępują w ciągu 1 tygodnia lub wystąpią działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- w przypadku wystąpienia duszności, gorączki, odkrztuszania krwistej lub ropnej wydzieliny lub gdy objawy choroby nie ustąpią w ciągu tygodnia, należy skontaktować się z lekarzem
- nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej
- nie stosować z innymi produktami zawierającymi wyciąg z korzenia perlargonii

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- obserwowano łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, utrudnione połykanie), łagodne krwawienia z dziąseł lub nosa oraz reakcje alergiczne. Częstotliwość występowania była bardzo rzadka
- odnotowano również przypadki toksycznego działania na komórki wątroby. Ich częstotliwość nie jest znana

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią z powodu braku wystarczających danych

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła

- przechowywać w temperaturze pokojowej
- chronić przed światłem i wilgocią
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa

Podmiot odpowiedzialny:

Phytopharm Klęka S.A. Klęka 1 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.