

## Pelafen med, 6+ syrop 100ml



Cena: 25,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Phytofarm
Substancja czynna	Pelargonium sidoides
Typ produktu	Lek ziołowy

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

### Pelafen Med 6+ syrop - 100 ml

#### Opis produktu:

**Pelafen** jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym w postaci syropu, zawierającym suchy wyciąg z korzenia pelargonii stosowany w objawowym leczeniu przeziębienia

#### Skład:

- **substancja czynna:** suchy wyciąg z korzenia pelargonii (Pelargonii radicis extractum siccum)
- **substancje pomocnicze:** maltodekstryna, maltitol ciekły ( E 965), sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420), potasu sorbinian (E 202), kwas cytrynowy (E 330), woda oczyszczona

**2,5 ml syropu zawiera:** 20 mg suchego wyciągu (4-25:1) z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzenia pelargonii); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m)

#### Wskazania:

- produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania
- objawowe leczenie przeziębienia

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

- **dzieci 6-11 lat:** 2,5 ml syropu 2 razy na dobę
- **dzieci 12+ dorośli i osoby w podeszłym wieku:** 2,5 ml syropu 3 razy na dobę
- **nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat**

**dawka jednorazowa zawiera 625,1 mg sorbitolu (sorbitol ciekły zawiera 70% sorbitolu) i 893 mg maltitolu**

Pelafen MED zawiera miarkę, która służy do odmierzenia odpowiedniej ilości syropu

Należy wstrząsnąć butelkę przed użyciem

Jeśli mimo stosowania leku Pelafen MED objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni należy skonsultować się z lekarzem

## Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- w przypadku wystąpienia duszności, gorączki, odkrztuszania krwistej lub ropnej wydzieliny lub gdy objawy choroby nie ustąpią w ciągu tygodnia, należy skontaktować się z lekarzem
- nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej
- nie stosować z innymi produktami zawierającymi wyciąg z korzenia perlargonii

Lek zawiera maltitol- 893 mg w dawce jednorazowej (2,5ml). Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Lek zawiera 625,1 mg sorbitolu w dawce jednorazowej(2,5ml). Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych zgodnie z bazą MedDRA:

**Bardzo rzadko (może wystąpić u 1 pacjenta na 10,000 przyjmujących lek):**

- łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, utrudnione połykanie), łagodne krwawienia z dziąseł lub nosa oraz reakcje alergiczne

**Częstość nieznaną (nie można określić na podstawie dostępnych danych):**

- przypadki hepatotoksyczności (uszkodzenia wątroby)

## Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią z powodu braku wystarczających danych

## Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- przechowywać w temperaturze pokojowej
- chronić przed światłem i wilgocią
- lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C oraz zużyć w ciągu 3 miesięcy
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa

## Podmiot odpowiedzialny:

Phytopharm Kłęka S.A. Kłęka 1 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.