

Permen Med Forte, 4 tabletki powlekane



Cena: 22,90 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	WALMARK A.S.
Substancja czynna	Sildenafilum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Permen Med Forte, 50 mg, 4 tabletki powlekane

(Sildenafilum)

Skład:

Substancją czynną jest: Syldenafilum

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, Wapnia wodorofosforan, Kroskarmeloza sodowa, Magnezu stearynian,

Otoczka: Opadry II blue 85F505164: Alkohol poliwinylowy - częściowo zhydrolizowany, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 3350, Talk, Indygokarmin, lak (E 132), Opadry Clear 02K19253;, Hypromeloza 5cp (2910), Triacetyn

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.

Wskazania:

- Produkt leczniczy Permen Med Forte jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do satysfakcjonującej aktywności seksualnej.

- Do skutecznego działania produktu leczniczego Permen Med Forte niezbędna jest stymulacja seksualna.

Działanie:

- Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.
- Permen Med Forte pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych:

- Jeśli pacjent stosował wcześniej produkty lecznicze zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecaną dawką jest 50 mg syldenafilu przyjmowane, w zależności od potrzeb, około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W przeciwnym razie produkt leczniczy Permen Med. Forte w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu terapeutycznego (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku). Maksymalna zalecana częstość przyjmowania produktu leczniczego to raz na dobę.
- Jeżeli produkt leczniczy Permen Med Forte jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia leku na czczo.
- W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, może on zalecić dawkę początkową 50 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu leczniczego, lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg syldenafilu.

Szczególne populacje pacjentów:

Pacjenci w podeszłym wieku:

- Dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane (? 65 lat).

Zaburzenia czynności nerek:

- Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie „Stosowanie u dorosłych” dotyczą pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny = 30 – 80 ml/min).
- U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny