

Piascledine, zwyrodnienie, stawów, kolanowych, 30kapsulek



Cena: 74,60 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Laboratories
Substancja czynna	Avocado, Glycine max
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Piascledine 100 mg + 200 mg, kapsułki twarde - 30 sztuk

(Avocado, Glycine max)

Opis produktu:

Piascledine to lek stosowany w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Lek zawiera niezmydlające się frakcje oleju awokado oraz oleju sojowego.

Skład:

Substancje czynne: olej awokado frakcji niezmydlającej się i olej sojowy frakcji niezmydlającej się.

Substancje pomocnicze - butylohydroksytoluen, krzemu dwutlenek koloidalny, tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, erytrozyna (E 127), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna wołowa (Typu B), polisorb 80.

1 kapsułka twarda zawiera 100 mg oleju awokado i 200 mg oleju sojowego.

Wskazania:

- Produkt leczniczy Piascledine 300 jest wskazany do stosowania u dorosłych w powolnym leczeniu (łagodzeniu) objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Działanie:

- Lek **Piascledine** łagodzi objawy zwyrodnieniowe chrząstki stawowej, w tym dolegliwości bólowe i w wyniku tego usprawnia aparat ruchowy.
- Działanie leku związane jest z modyfikacją struktury chrząstki stawowej i zmniejszeniem procesu jej niszczenia.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

- Lek podaje się doustnie, podczas posiłku.
- Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.
- Nie należy jej rozgryzać ani żuć.
- Leczenie zwykle trwa od 3 do 6 miesięcy, a samo działanie leku **Piascledine** może wystąpić z opóźnieniem do kilku tygodni.
- Jeśli pacjent uważa, że poprawa nie następuje zbyt szybko, nie powinien przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku wrażenia iż działanie leku jest za słabe lub za mocne należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Nie należy stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na awokado, soję lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma uczulenie na orzechy ziemne (np. orzeszki arachidowe, fistaszki).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia czynności wątroby (występujące niezbyt często):

- Uszkodzenie wątroby lub dróg żółciowych, niekiedy połączonych z bólem brzucha, nudnościami, przebarwieniem stolca, ciemną barwą moczu, zażółceniem skóry oraz podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych we krwi

Często: (1 na 10 osób)

- Biegunka

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 100 pacjentów):

- zgaga, nudności, nieprzyjemny posmak w ustach, ból brzucha, zmiana zabarwienia stolca
- czerwona wysypka na skórze,
- ból głowy
- osłabienie, zmęczenie,
- ból piersi, obrzęk piersi i krwawienie z dróg rodnych
- swędzenie skóry, wysypka skórna, pokrzywka, zaczerwienienie skóry,, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu, zmiany na błonach śluzowych
- obniżone ciśnienie krwi

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 pacjentów):

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe: zapalenie jelit, wymioty, suchość w ustach, odbijanie,
- egzema
- kamica nerkowa
- zaburzenia krzepnięcia krwi, takie jak obniżenie płytek krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

- Jeśli pacjent cierpi lub w przeszłości cierpiał na chorobę wątroby lub pęcherzyka żółciowego powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceutce przed zastosowaniem leku.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy dotyczące problemów z wątrobą lub drogami żółciowymi takie jak nudności z niewyjaśnionej przyczyny, wymioty, ból brzucha, zmęczenie, utrata apetytu, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczką) ciemna barwa moczu należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w okresie rozrodczym, nie stosujących skutecznej antykoncepcji. Brak wystarczających danych dotyczących wpływu leku na płodność.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- **Piascledine** jest lekiem przeznaczonym wyłącznie dla dorosłych. Nie należy go stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku przez pacjentów przyjmujących jednocześnie antykoagulanty, ze względu na potencjalne ryzyko zaburzeń krzepnięcia.
- Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje lek **Piasclidine** jednocześnie z innymi lekami w leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

LABORATOIRES EXPANSCIENCE, Ul. Żelazna 67/78 WARSZAWA

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.