

Pikopil 7,5 mg 30 tabletek



Cena: 32,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Farmak
Substancja czynna	Natrii picosulfas
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Pikopil 7,5mg 30 tabletek

(Natrii picosulfas)

Opis produktu:

Pikopil jest stosowany do krótkotrwałego łagodzenia dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym zaparciem u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Skład:

- Substancja czynna - sodu pikosiarczan
- Substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Wskazania:

- Krótkotrwałe leczenie przewlekłego lub nawykowego zaparcia

Działanie:

Pikopil jest stosowany do krótkotrwałego łagodzenia dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym zaparciem

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki. W celu uzyskania regularnego wypróżnienia dawkę można dostosować do maksymalnej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać maksymalnej, zalecanej dawki dobowej.

- **Dorośli:** 5 mg - 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabletki produktu Pikopil o mocy 7,5 mg), przed snem.

Dawkowanie można ustalać indywidualnie. Po uzyskaniu regularnych wypróżnień należy zmniejszyć dawkę i zazwyczaj leczenie można przerwać.

- **Dzieci od 10 lat:** 5 mg - 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabletki produktu Pikopil o mocy 7,5 mg), przed snem.

Nie należy stosować produktu Pikopil o mocy 7,5 mg u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną, inne triarylometany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Zaburzenia pasażu treści pokarmowej przez jelita (na przykład niedrożność).
- Ostre choroby zapalne jelit.
- Ciężkie, bolesne i (lub) przebiegające z gorączką, ostre stany w obrębie jamy brzusznej (na przykład zapalenie wyrostka robaczkowego), potencjalnie związane z nudnościami i wymiotami.
- Ciężkie odwodnienie.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy)
- ból głowy, szumy uszne
- przyspieszone bicie serca (tachykardia); obniżone ciśnienie tętnicze krwi
- nudności, wymioty, biegunka ból brzucha

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- Skurcze w obrębie jamy brzusznej,
- ból brzucha,
- dyskomfort w obrębie jamy brzusznej

Bardzo często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- Biegunka

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przedłużone lub nadmierne stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodnoelektrolitowej i hipokaliemii, odwodnienia lub biegunki.
- U pacjentów stosujących pikosiarczan sodowy notowano zawroty głowy i (lub) omdlenie.
- Dostępne dane w tych przypadkach wskazują, że omdlenia podczas defekacji (lub omdlenia podczas parcia na stolec) lub odpowiedź wazowagalna są spowodowane bólem brzucha związanym
- z zaparciem, a niekoniecznie podaniem pikosiarczanu sodowego.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
- Tak jak w przypadku wszystkich środków przeczyszczających, produktu Pikopil nie należy stosować
- codziennie, przez długi okres czasu, bez ustalenia przyczyny zaparcia.
- Pikopil może być stosowany u dzieci wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Nie należy kontynuować leczenia, jeśli nie wystąpi wypróżnienie.
- Substancja pomocnicza laktoza
- Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
- galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Przyjmowanie nadmiernych dawek produktu leczniczego Pikopil i jednoczesne stosowanie leków moczopędnych lub adrenokortykosteroidów może zwiększać ryzyko zaburzeń równowagi elektrolitowej.

- Zaburzenia równowagi elektrolitowej mogą prowadzić do zwiększonej wrażliwości na glikozydy nasercowe.
- Jednoczesne stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania może zmniejszać działanie przeczyszczające produktu leczniczego Pikopil.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Farmak International Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.