

## Pirolam 1% zawiesina na skórę 0,01g/g 20g



Cena: 30,69 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA  
S.A.

Substancja  
czynna Ciclopiroxum

Typ produktu

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Pirolam, 1% zawiesina na skórę 20 g

(ciclopirox olaminum)

### Opis:

**Pirolam** to lek w postaci zawiesiny do stosowania miejscowego na skórę. **Pirolam** zawiera cyklopiroks z olaminą o działaniu przeciwgrzybiczym a także przeciwzapalnym. Zawiesinę stosuje się w leczeniu grzybicy skóry gładkiej i owłosionej a także stóp oraz podudzi. **Pirolam** jest przeznaczony do stosowania u dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

### Skład:

**Substancją czynną** leku jest cyklopiroks z olaminą (Ciclopirox olaminum). 1 g zawiesiny na skórę zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.

**Substancje pomocnicze:** glikol propylenowy, alkohol benzylowy, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, kwas mlekowy, makrogolu eter cetostearylowy, woda oczyszczona.

### Działanie :

**Pirolam** zawiera cyklopiroks z olaminą, który działa na występujące na skórze dermatofity, grzyby drożdżopodobne, pleśnie oraz mieszane zakażenia grzybicze. Cyklopiroks z olaminą działa także na niektóre bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne a także hamuje wzrost Mycoplasma, Trichomonas i Chlamydia.

**Pirolam** wykazuje również działanie przeciwzapalne, co jest szczególnie ważne, jeśli występuje stan zapalny.

**Pirolam** przenika do skóry poprzez naskórek, mieszki włosowe i gruczoły łojowe.

## Wskazania:

Leczenie grzybic skóry gładkiej oraz owłosionej a także stóp, paznokci, podudzia wywołanych przez:

Zakażenia niektórymi bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi.

- Trichophyton rubrum,
- Trichophyton mentagrophytes,
- Epidermophyton floccosum,
- Microsporum canis,
- Microsporum gypseum,
- Candida albicans,
- Candida tropicalis,
- Candida krusei,
- Candida parapsilosis,
- Cryptococcus neoformans,
- Aspergillus fumigatus,
- Malassezia furfur (dawniej Pityrosporum ovale).

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się miejscowo na skórę. Po aplikacji zawiesiny nie stosować opatrunków i plastrów.

**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:** 2 razy na dobę należy nanosić zawiesinę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia.

- Optymalny czas leczenia wynosi 3 tygodnie. **Pirolam** należy stosować do ustąpienia objawów. Aby zapobiec nawrotowi choroby zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres do 10 dni po ustąpieniu zmian chorobowych.
- Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku wątpliwości odnośnie przyczyny zakażenia przed zastosowaniem leku należy zwrócić się po poradę do lekarza.

## Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Pirolam**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeżeli pacjent ma grzybicze zapalenie oka, okolic oczu lub pochwy,

- u dzieci poniżej 6 lat.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Często występujące** działania niepożądane( u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- obrzęk.

**Rzadko występujące** działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

- alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

**Częstość nieznaną:**

- pieczenie, podrażnienie skóry, rumień, świąd.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy koniecznie zwrócić się do lekarza w przypadku:

- pacjentów chorych na cukrzycę, zaburzenia krążenia w dłoniach i stopach, zaburzenia odporności (np. zakażenia HIV, pacjenci po transplantacji, pacjenci leczeni jednocześnie kortykosteroidami, pacjenci z nawracającym lub długotrwałe utrzymującym się półpaścem lub opryszczką),
- osób z chorobami skóry, np. łuszczycę lub inne przewlekłe choroby skóry.

**Pirolam** zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy, które mogą powodować podrażnienia skóry, miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

- Swędzących, zakażonych miejsc nie należy drapać.
- Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.
- Unikać noszenia ubrań i obuwia nieprzepuszczającego wilgoci i ciepła.
- Po myciu i kąpieli miejsca chorobowo zmienione należy dokładnie osuszyć.
- Odzież stykającą się ze zmienioną chorobowo skórą, ręczniki i gąbki należy zmieniać codziennie i prać w temperaturze 90°C (zaleca się używanie ręczników jednorazowych).
- Nie należy stosować mydeł o kwaśnym odczynie, ponieważ stwarza to korzystne warunki do rozwoju grzybów z rodzaju Candida.

## Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne.
- Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
- Leku nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu,
- Chronić przed światłem, przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Przydatność do użycia po pierwszym otwarciu tuby wynosi 3 miesiące.

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Stargard Gdański

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.