

Pirolam Intima 500 mg x 1 tabletki dopochwowa

Cena: 25,59 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Clotrimazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Pirolam intima vag - 1 tabletki dopochwowa

(Clotrimazolum)

Opis produktu:

Pirolam Intima Vag to lek w postaci tabletek dopochwowych wskazany w leczeniu zakażeń żeńskich zewnętrznych narządów płciowych pochwy i sromu

Skład:

- Substancja czynna - klotrymazol
- Substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, kwas adypinowy, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana

Każda tabletki dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu (Clotrimazolum)

Wskazania:

- leczenie infekcji pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol

Działanie:

- **Klotrimazol** jest miejscowo działającym środkiem przeciwgrzybiczy. Praktycznie nie wchłania się przez skórę, a w niewielkim stopniu wchłania się przez błony śluzowe
- charakteryzuje się szerokim zakresem działania przeciwgrzybiczego, dzięki któremu niszczy grzyby obecne na powierzchni skóry, jednocześnie hamując ich wzrost. Związek ten jest skuteczny wobec takich drobnoustrojów, jak dermatofity, drożdżaki i pleśnie
- Zakażenia grzybicze pochwy pojawiają się na skutek zaburzenia naturalnej równowagi w organizmie, np. w wyniku stosowania antybiotykoterapii, niektórych leków przeciwcukrzycowych, środków antykoncepcyjnych, w wyniku uszkodzenia pochwy lub ze względu na ogólne osłabienie organizmu
- Najczęstszymi objawami zakażenia pochwy są swędzenie w pochwie oraz w jej okolicach, ból i pieczenie, które nasila się w wyniku tarcia i drapania. Dodatkowo mocz może pogarszać objawy w wyniku podrażnienia tkanek
- Typowym objawem zakażenia są również upławy, czyli biała, bezwonna wydzielina z pochwy. Upławy nasilają się zwykle przed menstruacją. Aby zapobiegać zakażeniom pochwy, zaleca się przestrzeganie kilku podstawowych zasad dotyczących przede wszystkim higieny delikatnych okolic intymnych. Zaleca się delikatne mycie i osuszanie okolic pochwy, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych podrażnień, jak również noszenie odpowiedniej garderoby, zwłaszcza bielizny
- Lek Pirolam Intima Vag jest pomocy w leczeniu objawów zakażenia grzybiczego pochwy i sromu

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat:

- jedna tabletkę dopochwowa, głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, przed snem

Młodzież w wieku od 12 do 15 lat :

- u młodzieży w wieku poniżej 16 lat, Pirolam Intima Vag można stosować tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentek (po pierwszej miesiączce), zalecane dawkowanie jest takie samo, jak u dorosłych.

Jedna tabletkę dopochwowa, głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, przed snem. Tabletkę dopochwowa powinna zostać umieszczona tak głęboko w pochwie, jak to możliwe.

W przypadku braku poprawy po 7 dniach od zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- uczulenie (nadwrażliwość) na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku

- nie stosować poniżej 16 roku życia bez konsultacji z lekarzem
- nie należy stosować tabletek dopochwowych w trakcie miesiączki (należy zakończyć stosowanie leku przed rozpoczęciem krwawienia miesięczkowego)

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Często (częściej niż u 1 na 100 osób):

- pieczenie

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000 osób):

- ból brzucha, swędzenie, zaczerwienienie skóry i (lub) podrażnienie;

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje alergiczne, obrzęk, wysypka skórna, krwawienie z pochwy;

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- złuszczenie w obrębie narządów płciowych, uczucie dyskomfortu, bóle w obrębie miednicy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie należy samodzielnie stosować leku Pirolam Intima w przypadku, gdy inne doustne leki przeciwgrzybicze były nieskuteczne podczas leczenia obecnej infekcji

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą, w szczególności:

- gdy do zakażeń pochwy doszło pierwszy raz
- gdy wystąpiły co najmniej 4 przypadki zakażeń w ciągu ostatniego roku
- w przypadku gorączki 38°C lub wyższej
- gdy pacjentka odczuwa ból w dolnej części brzucha, ból pleców,
- w przypadku cuchnących upławów
- w przypadku nudności
- gdy występuje krwawienie z pochwy i ból
- w trakcie stosowania leku Pirolam Intima Vag nie należy stosować tamponów, płukania pochwy, środków plemnikobójczych lub innych produktów do stosowania dopochwowego
- podczas stosowania tabletek dopochwowych z klotrimazolem należy unikać stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera seksualnego

- skuteczność antykoncepcyjna lateksowych środków antykoncepcyjnych, takich jak prezerwatywy i krążki dopochwowe, może być zmniejszona

Dzieci i młodzież:

- lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat
- u młodzieży w wieku poniżej 16 lat, Pirolam Intima Vag można stosować tylko po konsultacji z lekarzem
- nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Pirolam Intima Vag u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Jako środek ostrożności należy unikać stosowania klotrimazolu w trakcie pierwszych trzech miesięcy ciąży
- Nie zaleca się stosowania tabletek dopochwowych Pirolam Intima Vag w trakcie karmienia piersią
- Jako środek ostrożności należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia
- W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

