

# PlantagoPharm syrop, suchy kaszel, 100 ml



Cena: 6,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Phytopharm Klęka
Substancja czynna	Plantago lanceolata
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### PlantagoPharm 506 mg/5 ml, syrop, 100 ml

Syrop PlantagoPharm to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany jako środek łagodzący w objawowym leczeniu podrażnienia jamy ustnej i gardła oraz związanego z nim suchego kaszlu. **Lek wskazany jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat.**

## Wskazania:

Środek łagodzący wskazany w objawowym leczeniu podrażnienia jamy ustnej i gardła oraz związanego z nim suchego kaszlu.

## Skład:

5 ml syropu zawiera:

- **substancja czynna:** płynny wyciąg z liścia babki lancetowatej (*Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum*) 506 mg,
- **ekstrahent:** etanol 25% V/V,
- **substancje pomocnicze:** sacharoza, koncentrat o smaku czarnej benzoesan sodu (E 211), eugenol, linalol oraz graniol, potasu sorbinian, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 1,8% m/m.

## Działanie:

Łagodzące w przypadku podrażnień jamy ustnej i gardła.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjąć następujący schemat stosowania leku:

- **dzieci od 3 do 4 lat:** przyjmować 3 razy dziennie po 5 ml syropu,
- **dzieci od 5 do 11 lat:** przyjmować 3 razy dziennie po 10 ml syropu,
- **dzieci powyżej 12 lat oraz dorośli:** przyjmować 3 do 4 razy dziennie po 10 ml syropu.

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu jej uzupełnienia, a zwyczajnie kontynuować przyjmowanie leku. Jeśli Pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy skonsultować to z lekarzem. Kontakt z lekarzem konieczny jest w przypadku nieustąpienia objawów po 7 dniach stosowania PlantagoPharm.

## Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

## Działania niepożądane:

PlantagoPharm, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, jednak dotychczas nie zostały odnotowane.

## Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, niedawno oraz wszystkich tych, które pacjent w najbliższym czasie planuje przyjmować.
- Nie odnotowano interakcji dotyczących stosowania składnika aktywnego leku PlantagoPharm z jednoczesnym przyjmowaniem innych leków.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przy stosowaniu leku PlantagoPharm należy zachować szczególną ostrożność ze względu na zawarte w nim cukier i etanol. Lek zawiera 1,8% etanolu.
- Dawka 5 ml zawiera maksymalnie 0,11 g etanolu, co odpowiada około 1,2 ml wina i około 2,8 ml piwa.
- Dawka 10 ml zawiera maksymalnie 0,22 g etanolu, co odpowiada około 2,3 ml wina i około 5,6 ml piwa.
- Stosując dawki jednorazowe 5 ml lub 10 ml pacjent otrzymuje więcej niż 100 mg etanolu w dawce jednorazowej. Jest to działanie szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć to pod uwagę również podczas stosowania u kobiet

ciężarnych lub karmiących piersią oraz u dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką.

- Diabetycy przed zażyciem leku PlantagoPharm powinni uwzględnić fakt, że jednorazowa dawka (5 ml) zawiera około 3,5 g cukru, co odpowiada 0,29 jednostki chlebowej.
- Osoby, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

#### **Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:**

- Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią. Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie produktu w tym czasie nie jest zalecane. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:**

- Stosowany zgodnie z zalecanym dawkowaniem lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Znacznie przedawkowany może spowodować wykrycie alkoholu w wydychanym powietrzu.

#### **Stosowanie z jedzeniem i pićem:**

- Nie wpływa na działanie leku.

## **Przechowywanie:**

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Chronić przed wilgocią.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

## **Podmiot odpowiedzialny:**

Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

## **Dodatkowe informacje:**

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.