

Pluscard, 0,1g+0,04g, kwas acetylosalicylowy, zapobiega zawałowi serca, 60 tabl.



Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum, Glycinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Pluscard 100 mg + 40 mg tabletki 60 sztuk

(Acidum acetylsalicylicum,Glycinum)

Opis produktu:

Pluscard to lek, który zawiera dwie substancje czynne. Pierwszą z nich jest kwas acetylosalicylowy zmniejszający agregację, czyli „zlepianie się” płytek krwi. Glicyna ochrania przewód pokarmowy przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego, ale także wspiera jego wchłanianie.

Skład:

- Substancja czynna - kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i glicyna (Glycinum).
- Substancje pomocnicze - skrobia ziemniaczana, talk.

1 tabletkę zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego i 40 mg glicyny.

Wskazania:

Wskazaniami do zastosowania leku **Pulscard** są:

- zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u osób z chorobą sercowo-naczyniową,
- zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebyłym zawałe mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej,
- w świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca.

Działanie:

- **Pulscard** działa dwukierunkowo. Zawarty w nim kwas acetylosalicylowy odpowiada za zmniejszenie agregacji płytek krwi, co przeciwdziała powstawaniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Druga substancja czynna, czyli glicyna, chroni przewód pokarmowy przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego a także zwiększa jego rozpuszczalność, ułatwiając wchłanianie.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Decyzję o rozpoczęciu leczenia i stosowanej dawce leku **Pulscard** powinien podjąć lekarz.

Pulscard stosuje się doustnie, popijając tabletkę szklanką wody w czasie lub po posiłku. Tabletki należy połykać w całości (z wyjątkiem wskazania: świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca).

Ze względu na zawartość kwasu acetylosalicylowego lek jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 16 lat.

- **Wskazanie:** Dawkowanie
- **zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego:** 1 tabletkę dziennie
- **zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebyłym zawałe mięśnia sercowego:** 1 tabletkę dziennie
- **zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebyłym udarze mózgu:** 2 tabletki na dobę
- **zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytych zabiegach na naczyniach wieńcowych:** 1 tabletkę dziennie
- **dławica piersiowa:** 1 tabletkę dziennie
- **świeży zawał serca lub jego podejrzenie:** jednorazowo dokładnie rozgryźć 3 tabletki.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku **Pulscard**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, glicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku nadwrażliwości na salicylany lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. astma aspirynowa, gorączka sienna,
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, dnę moczanową, ciężką niewydolność wątroby, nerek, serca

- u osób z zwiększoną skłonnością do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną),
- jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (choroba genetyczna krwinek czerwonych), gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować hemolizę - niszczenie krwinek czerwonych lub niedokrwistość hemolityczną - niedokrwistość spowodowaną nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych,
- u kobiet w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży),
- u dzieci poniżej 16 lat.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala jeśli wystąpi obrzęk okołonaczyniowy lub wystąpią krwawienia, np. z czarne stolce.

Pulscard może powodować następujące działania niepożądane:

- ból brzucha, zgaga lub niestrawność, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności z wymiotami lub bez wymiotów,
- uszkodzenie błony śluzowej żołądka,
- nawroty choroby wrzodowej,
- krwawienia z przewodu pokarmowego (czarne, smoliste stolce), perforacje (przedziurawianie żołądka lub jelita). Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy,
- ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie),
- przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny,
- białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek,
- niewydolność serca,
- nadciśnienie tętnicze,
- szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy,
- małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia), zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu krzepnięcia,
- szczególnie u pacjentów z astmą, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (trudności w oddychaniu, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem leczenia produktem **Pulscard** należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

- występują utrzymujące się objawy dzwonienia lub szumu w uszach oraz ból głowy, gdyż w przypadku długotrwałego

stosowania leku mogą one wskazywać na jego przedawkowanie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku,

- planowany jest zabieg chirurgiczny, to należy odstawić lek na 5 do 7 dni wcześniej, aby ograniczyć ryzyko wydłużonego czasu krwawienia podczas oraz po zabiegu,
- występują krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, stosowana jest wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna,
- pacjent chorował na wrzody żołądka lub dwunastnicy.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ciąża:
- Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie stosować leku w czasie ostatniego trymestru ciąży bez specjalnego polecenia lekarza, ponieważ kwas acetylosalicylowy może powodować wady rozwojowe u płodu i komplikacje podczas porodu.
- Karmienie piersią:
- Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Salicylany przechodzą w niewielkich ilościach do mleka matki, dlatego należy unikać stosowania leku w czasie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Leku **Pulscard** nie stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

-

Pulscard może wchodzić w interakcje z:

- inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE),
- acetazolamidem,
- lekami przeciwzakrzepowymi (np. heparyna, warfaryna),
- kwas walproinowy,
- lekami moczopędnymi,
- metotreksatem,
- niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ, np. ibuprofen) lub lekami przeciwbólowymi (np. paracetamol),
- glikokortykosteroidami,
- lekami przeciwcukrzycowymi,

- lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon),
- digoksyną,
- lekami trombolitycznymi,
- lekami spazmolitycznymi (np. baklofen),
- związkami metali,
- metamizol.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićem:

- **Pluscard** należy przyjmować w czasie lub po posiłku i popijać 1 szklanką płynu.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze do 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja apolska Sp. z o.o., Ul Partyzancka, Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.