

Płyn Lugola, roztwór wodny jodu, 40 g



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Coel
Substancja czynna	Iodi solutio aquosa
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Płyn Lugola, roztwór wodny jodu - 40 g

Opis produktu:

Płyn Lugola do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Roztwór na skórę, roztwór do stosowania w jamie ustnej.

Skład:

1 g płynu zawiera: substancje czynne: jod 10 mg, jodek potasu 20 mg

Wskazania:

- Zewnętrznie do odkażania skóry, przemywania drobnych zranień i otarć.
- Po rozcieńczeniu wodą stosuje się do płukania gardła;
- Po rozcieńczeniu gliceryną do pędzlowania migdałków.

Działanie:

Jod zawarty w Płynie Lugola ma **silne działanie antyseptyczne**, dzięki czemu więc znalazł on zastosowanie do dezynfekcji ran. **Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.**

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- **Zewnętrznie** - jako środek antyseptyczny na skórę, roztwór nie rozcieńczony.
- **Do płukania gardła** - 10 kropli roztworu na szklanekę (200 ml) wody.
- **Do usuwania nalotu z migdałków** - 10 kropli na kieliszek (50 ml) gliceryny.

Doustnie wyłącznie w dawkach indywidualnie uzgodnionych z lekarzem. Należy rozpuścić zalecaną ilość preparatu w szklance wody, mleka lub soku aby uniknąć podrażnienia żołądka.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować przy nadwrażliwości na jod, nadczynności tarczycy, gruźlicy płuc, zapaleniu opryszczkowym skóry (choroba Dühringa).
- Nie należy stosować u noworodków i niemowląt.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- U osób nadwrażliwych na jod może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy nosowo - gardłowej i wysypka.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Może zaburzać badania czynnościowe tarczycy.
- Nie należy stosować ze związkami rtęci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Podany doustnie hamuje czynność tarczycy.

Ciąża i karmienie piersią:

- Zewnętrznie stosować ostrożnie w przypadku przerwania ciągłości skóry.
- W okresie karmienia dziecka piersią, przed zastosowaniem leku, należy zasięgnąć opinii lekarza.

- Nie stosować leku doustnie w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

COEL, Władysława Żeleńskiego 45, Kraków.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.