


# Płyn Lugola, Solutio Iodi Cum Glycerini, 20g



Cena: 17,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Coel
Substancja czynna	Iodum, Kalii iodidum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

**Coel Solutio Iodi Cum Glycerini (Płyn Lugola), 10mg+20mg/g, płyn - 20 g (Iodum + Kalii iodidum)**

## Opis produktu:

Płyn Lugola (Solutio Iodi Cum Glycerini) to produkt leczniczy do stosowania miejscowego do odkażania nieuszkodzonej skóry, otarcie naskórka, brzegów ran, drobnych zadrapań.

## Skład:

- Substancja czynna: jod (Iodum) i jodek potasu (Kalii iodidum).
- Substancje pomocnicze: glicerol 99,5%, woda oczyszczona.

1 g płynu zawiera 10 mg jodu i 20 mg jodku potasu.

## Wskazania:

- odkażanie skóry nieuszkodzonej,
- odkażanie otarć naskórka, drobnych zadrapań i brzegów ran.

## Działanie:

- Płyn Lugola wykazuje działanie antyseptyczne i odkażające.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

**Sposób użycia:** miejsce zmienione chorobowo przemyć za pomocą jałowego gazika nasączonego roztworem lub pędzlować.

- Lek do stosowania zewnętrznego, na skórę.
- Płyn stosować nierozcieńczony.

## Przeciwwskazania:

**Nie stosować Płynu Lugola:**

- w przypadku nadwrażliwości na jod,
- jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy, gruźlicę płuc, niewydolność nerek,
- u noworodków i niemowląt,
- bezpośrednio na rany i oparzenia.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Częstość nieznaną:**

- podrażnienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, zapalenie skóry ze świądem oraz pęcherzykami u osób nadwrażliwych.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Płyn Lugola może wchodzić w interakcje z:**

- tyreostatykami,

- lekami zawierającymi rtęć.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z wystąpieniem nadczynności tarczycy, trądzikiem jodowym opornym na leczenie, miejscową lub uogólnioną alergią.
- Stosowanie **Płynu Lugola** na duże powierzchnie ciała może wiązać się z wystąpieniem nadczynności tarczycy (szczególnie u pacjentów z utajonymi zaburzeniami czynności tarczycy - osoby w podeszłym wieku).
- Stosowanie leku u noworodków/niemowląt ze względu na wchłanianie się jodu, może prowadzić do niedoczynności tarczycy, neutropenii, kwasicy metabolicznej.

### Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u niemowląt i noworodków.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

COEL, Władysława Żeleńskiego 45, Kraków.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym