

Polcrom, 20 mg/ml, krople do oczu, 2x5ml



Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa Warszawa
Substancja czynna	Acidum cromoglicicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Polcrom 20 mg/ml, krople do oczu - 2 x 5 ml

(Natrii cromoglicas)

Skład:

- Substancją czynną jest - sodu kromoglikan
- Substancje pomocnicze - sorbitol; disodu fosforan dwunastowodny; sodu diwodorofosforan jednowodny; disodu edetynian; sodu chlorek; polisorbat 80; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

1 ml roztworu (kropli) zawiera 20 mg sodu kromoglikanu.

Wskazania:

- Alergiczne zapalenie spojówek i rogówki, w tym alergię wiosenne i sezonowe.

Działanie:

- Polcrom wykazuje działanie przeciwalergiczne, hamuje uwalnianie mediatorów reakcji alergicznych, m.in. histaminy.
- Kromoglikan stabilizuje błonę komórkową komórek tucznych, przez co dochodzi do zahamowania wydzielania mediatorów zapalnych.
- Kromoglikan hamuje wczesne i późne reakcje alergiczne.
- Polcrom posiada odczyn pH identyczny jak płyn łzowy.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosuje się 1–2 kropli do worka spojówkowego 4 razy na dobę, w równych odstępach czasu.

- Lek do stosowania do worka spojówkowego.
- Stosowanie leku należy zacząć w okresie bezobjawowym (przed kontaktem z alergenem) i stosować przez cały sezon.
- Podczas aplikacji kropli, nie należy dotykać zakraplaczem do oka, powieki, okolic oka - może to prowadzić do zakażenia kropli.

Przeciwwskazania:

Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- przemijające pieczenie,
- przemijające kłucie spojówek,
- miejscowe podrażnienie,
- mętne plamy na rogówce (w przypadku uszkodzonej rogówki).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **Lek zawiera chlorek benzalkoniowy** - może powodować podrażnienie oczu. Chlorku benzalkoniowego nie należy stosować z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem należy zdjąć soczewki i odczekać 15 minut przed ponownym założeniem. Chlorek beznalkoniowy zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Po pierwszym otwarciu butelki, kropli nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie.

Podmiot odpowiedzialny:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.