

Polocard, kwas acetylosalicylowy, lek przeciwzakrzepowy, 75mg, 60tabl.



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Zentivia
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Polocard, 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt.

(Acidum acetylsalicylicum)

Opis produktu:

Polocard 75 mg - produkt leczniczy zawierający kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się płytek krwi.

Skład:

- **Substancja czynna** - kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).
- **Substancje pomocnicze** - rdzeń: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

1 tabletkę zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Wskazania:

- Wskazaniami do stosowania Polocard 75 mg jest profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Działanie:

- Kwas acetylosalicylowy zawarty w leku Polocard 75 mg, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Zalecana dawka to: 1-2 tabletki na dobę.
- W świeżym zawałe serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca to: od 225 mg do 300 mg kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek.
- Lek należy przyjmować doustnie najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody.
- Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Polocard 75 mg:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;
- jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;
- jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej);
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną);
- jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
- jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- odczyny skórne,
- pokrzywki,
- świąd,
- zawroty głowy i szumy uszne,
- niewydolność serca,
- nadciśnienie tętnicze,
- zgaga,
- nudności i wymioty,
- brak łaknienia,
- bóle brzucha,
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
- białkomocz.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek **Polocard 75 mg** zawiera czerwień koszenilową, może powodować reakcje alergiczne.
- Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów.
- Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym pacjent powinien powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku **Polocard 75 mg**.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.
- Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki jak i u noworodka.
- Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Lek Polocard 75 mg jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 roku życia.

Wpływ na płodność:

- Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet.
- Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Polocard 75 mg może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciwzakrzepowymi,
- metotreksatem,
- inhibitorami konwertazy angiotensyny,
- lekami hamującymi agregację płytek krwi, gdyż występuje zwiększone ryzyko krwawienia,
- lekami moczopędnymi,
- niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
- lekami przeciwcukrzycowymi,
- lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego.

Stosowanie leku z jedzeniem i pić:

- Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.
- Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze do 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Praga (Czechy)

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.