

Polpharma, Ranigast SOS, 24 tabletki do ssania



Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Ranigast S-O-S tabletki do ssania 24 sztuki

Opis produktu:

Ranigast S-O-S, tabletki do ssania wyrób medyczny, wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga oraz ból w nadbrzuszu. **Łagodzi nadkwaśność oraz chroni śluzówkę żołądka.** Sole zobojętniające zawarte w produkcie neutralizują kwasotę soku żołądkowego, a alginiany tworzą warstwę ochronną na śluzówce żołądka, zmniejszając częstotliwość refluksu.

smak: cytrynowo - miętowy.

Skład:

Alginian sodu 200 mg, kwas alginowy 50 mg, wodorowęglan sodu 80 mg, węglan wapnia 140 mg; substancje pomocnicze: mannitol, sukraloza, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, behenian glicerolu, wyciąg z imbiru, olejek eteryczny z imbiru; aromat: cytrynowy, miętowy..

Sposób podania:

- Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 1-2 tabletki po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.
- Dzieci 6-12 lat: zaleca się przyjmować 1 tabletkę po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośrednich źródeł światła, w temperaturze poniżej 25oC.

Ostrzeżenia:

- Nie przekraczać zalecanej dawki, ponieważ większe ilości mogą doprowadzić do zaparcia lub przemijającej biegunki.
- Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku przewlekłych zaparć lub biegunki, choroby nerek lub przewlekłej niewydolności serca.
- Wyrób medyczny zasadniczo jest przeznaczony do stosowania u dorosłych po ukończeniu 18 roku życia.
- Ranigast S-O-S może być okazjonalnie stosowany u młodzieży lub dzieci od 6 lat, przy czym u dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat dawkę należy zmniejszyć o połowę i stosować produkt zgodnie z zaleceniami. W razie wątpliwości zalecana jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą
- Produkt nie powinien być stosowany nieprzerwanie dłużej niż przez 30dni. W przypadku potrzeby dłuższego stosowania zaleca się konsultację z lekarzem.
- Jeśli po pewnym okresie stosowania produkt nie doprowadzi do wyraźnego złagodzenia objawów, zaleca się konsultację z lekarzem.
- Każda tabletką jest przeznaczona do jednokrotnego użycia. Tabletkę należy wyjąć z blistra bezpośrednio przed użyciem.
- Nie przyjmować w przypadku nietolerancji lub zdiagnozowanej nadwrażliwości na składniki produktu.
- Wyrób może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE 0426**
- Posiada deklarację **zgodności UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

SITT srl, Via Ariost 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio, Włochy

Dystrybutor:

Z.F. Polpharma S.A., Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański