

Posterisan maść 25g



Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Dr.Kade
Substancja czynna	Escherichia coli
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Posterisan 166,7 mg, maść doodbytnicza - 25 g

(Standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia coli)

Opis produktu:

Posterisan to unikalny lek bez recepty na hemoroidy z formułą Escherichia coli BCS .

Skład:

Substancją czynną jest:

- standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia Coli

substancje pomocnicze:

- lanolina
- wazelina żółta

1 gram maści zawiera:

- substancję czynną: standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia Coli (zabitej 3,3 mg płynnego fenolu) 166,7 mg

Wskazania:

- świąd
- sączenie i pieczenie okolicy odbytu spowodowane guzkami krwawniczymi, szczelinami i rozpadlinami (ragadami) odbytu oraz wypryskiem

Działanie:

- miejscowa regeneracja tkanek,
- gojenie ran,
- eliminacja świądu i pieczenia,
- profilaktyka choroby hemoroidalnej,
- zapobiega nawrotom choroby.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Maść podaje się doodbytniczo
- Lek można przechowywać w temperaturze pokojowej, co ułatwi aplikację
- Leczenie należy kontynuować także kilka dni po ustąpieniu objawów stanu zapalnego, typu: pieczenie, sączenie.
- Podczas terapii możliwe jest brudzenie bielizny, dlatego zaleca się stosowanie podkładowych czy podpasek
- W przypadku aplikacji leku w kanale odbytu należy stosować dołączony do opakowania aplikator

Stosowanie aplikatora:

- Aplikator nakręca się na tubkę z maścią i zdejmuje się jego górną część. Po naciśnięciu tubki maść dostaje się do aplikatora i pojawia się w jego bocznych otworach. Następnie aplikator wprowadza się ostrożnie do odbytu
- Zwilżenie aplikatora maścią może ułatwić jego wprowadzanie do odbytu. Ponowne naciśnięcie tubki sprawia, że maść dostaje się do kanału odbytu. Ostrożne obracanie tubki prowadzi do odpowiedniego rozprowadzenia maści
- Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator, wyciskając niewielką ilość maści przez boczne otwory, wycierając powierzchnię wchłaniającym papierem, a następnie przykręcić ponownie górną część aplikatora. To zabezpiecza maść przed wysychaniem.

Zwykle stosowane dawkowanie leku Posterisan to wtarcie dwa razy na dobę, rano i wieczorem, po wypróżnieniu cienkiej warstwy maści (ok. 2,5 g) w skórę oraz błony śluzowe wymagające leczenia

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- W leku jako środek konserwujący zastosowano fenol. Rzadko, w przypadku nadwrażliwości mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne, powodujące zaczerwienienie i świąd
- Lek Posterisan zawiera lanolinę. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku wystąpienia zakażeń grzybiczych trzeba równocześnie stosować miejscowe leki przeciwgrzybicze.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
- Nie są znane przeciwwskazania dotyczące stosowania maści w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistrasse 2 12277 Berlin, Niemcy

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.