

## Proctanal enema, wlewka doodbytnicza, 120ml



Cena: 14,99 PLN

### Opis słownikowy

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Producent / Marka | Miralex                  |
| Substancja czynna | -                        |
| Typ produktu      | Wyrób medyczny leczniczy |

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Proctanal enema, wlewka doodbytnicza, 120ml

Proctanal enema to jednorazowy wyrób medyczny na bazie fosforanu sodu w postaci wlewki doodbytniczej.

### Skład:

- Substancje aktywne: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny

### Działanie:

- Fosforan sodu w postaci lewek doodbytniczych stosowany jest w celu oczyszczenia jelita grubego. Poprzez działanie osmotyczne w świetle jelita grubego zapobiega wchłanianiu wody powodując zmiękczenie mas kałowych. Zwiększenie objętości i zmiękczenie mas kałowych prowadzi do natychmiastowego pobudzenia odruchu defekacji.

### Dawkowanie:

- Należy stosować jedną lewatywę w razie potrzeby lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

## Wskazania:

- Leczenie zaparć, zwłaszcza gdy występują w postaci uporczywej i powodują znaczny dyskomfort i złe samopoczucie u pacjenta.
- Przygotowanie do badań radiologicznych i endoskopowych końcowego odcinka jelita, przed - i pooperacyjne oczyszczenie jelit.

## Sposób użycia:

### Jak prawidłowo zrobić wlewkę doodbytniczą?

- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 lewatywa (120 ml) dziennie.
- Wlewka doodbytnicza Proctanal Enema może być stosowana w temperaturze pokojowej.
- Wlewkę można umieścić w ciepłej wodzie (poprzez zanurzenie lub w strumieniu wody pod kranem).
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy położyć się na lewym boku.
- Należy usunąć opaskę ochronną z aplikatora doodbytniczego, ściągnąć osłonkę z butelki i nałożyć aplikator.
- Chwyć butelkę, delikatnie wsunąć aplikator do odbytu i powoli wycisnąć całą zawartość butelki
- Po zakończeniu aplikacji, należy pozostać w pozycji leżącej do momentu pocucia silnej potrzeby wypróżnienia, która zazwyczaj następuje w ciągu 5 minut.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik wyrobu medycznego.

## Przechowywanie:

- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- Zawiera etykietę w języku polskim
- W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu lub wcześniejszego zapalenia błony śluzowej może wystąpić podrażnienie błony śluzowej odbytu.
- Stosowanie przez dłuższy czas wymaga konsultacji z lekarzem.

Objętość netto: 120ml

## Producent:

Viale Ferrovie dello Stato, 1 - Zona ASI 80014 Giugliano in Campania, Italy

## Dystrybutor:

Miralex Sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Lotnicza 4