

Procto-Glyvenol, czopki doodbytnicze, 10 sztuk PhPoint



Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Pharmapoint
Substancja czynna	Tribenosidum, Lidocainum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Procto-Glyvenol - 10 czopków doodbytniczych

(Tribenosidum 400 mg + Lidocainum 40 mg)

Import równoległy - Medezin Sp. z o.o.

Opis produktu:

Czopki doodbytnicze Procto-Glyvenol to lek na hemoroidy, zawierający dwa składniki aktywne o uzupełniającym się działaniu.

Skład:

Substancją czynną jest:

- tribenozyd (Tribenosidum)
- lidokaina (Lidocainum)

substancje pomocnicze:

- tłuszcz (Witepsol E85)
- tłuszcz (Witepsol W35)

1 czopek zawiera:

- 400 mg tribenozydu
- 40 mg lidokainy

Wskazania:

- leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów

Działanie:

- przeciwzapalne
- przeciwobrzękowe
- przeciwbólowe
- przeciwświądowe
- przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego
- miejscowo znieczula i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- zalecane dawkowanie leku Procto-Glyvenol to 1 czopek rano oraz 1 czopek wieczorem - aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując 1 czopek raz na dobę
- Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.
- Lek podaje się doodbytniczo

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- nie stosować czopków Procto-Glyvenol u osób nadwrażliwych na tribenozyd, lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, albo na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (więcej niż 1 osoba na każde 10 000 leczonych, mniej niż 1 osoba na każde 1000 leczonych):

- pokrzywka
- świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, ból w miejscu podania

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000):

- reakcja anafilaktyczna
- zaburzenia sercowo-naczyniowe
- skurcz oskrzeli
- obrzęk naczynioruchowy
- obrzęk twarzy

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Procto-Glyvenol u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby
- W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca
- Nie wolno stosować leku doustnie
- Należy unikać kontaktu z oczami

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży
- Czopki na hemoroidy można stosować od 4 miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią, pod warunkiem nieprzekraczania zalecanych dawek

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek Procto-Glyvenol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Stosowanie u dzieci:

- Nie należy stosować leku Procto-Glyvenol u dzieci.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy Co. Cork Irlandia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.