

Procto-Glyvenol, krem doodbytniczy, 30 g Inpharm



Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Tribenosidum, Lidocainum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Procto-Glyvenol, krem doodbytniczy - 30 g IMPORT

(Tribenosidum 50 mg + Lidocainum 20 mg)

Opis produktu:

Maść Procto-Glyvenol to lek na hemoroidy, zawierający dwa składniki aktywne o uzupełniającym się działaniu. Do miejscowego leczenia zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Skład:

Substancją czynną jest:

- tribenozyd (Tribenosidum)
- lidokaina (Lidocainum)

substancje pomocnicze:

- sorbitanu stearynian (Arlacel 60); makrogolu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000); alkohol cetylowy; izopropylu palmitynian; parafina ciekła; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; sorbitol ciekły, niekrystalizujący; kwas stearynowy; woda oczyszczona

1 g kremu zawiera:

- 50 mg tribenozydu
- 20 mg lidokainy chlorowodorku

Wskazania:

- Łagodzenie dolegliwości spowodowanych hemoroidami.

Działanie:

- przeciwzapalne
- przeciwobrzękowe
- przeciwbólowe
- przeciwświądowe
- przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego
- miejscowo znieczula i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Krem stosuje się doodbytniczo
- Po każdym zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce
- W przypadku leczenia wewnętrznych hemoroidów krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzone jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu a po aplikacji umieścić na swoim miejscu
- Lek Procto-Glyvenol stosuje się rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć do 1 aplikacji kremu na dobę
- Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nie stosować leku Procto-Glyvenol u osób uczulonych na tribenozyd, lidokainy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, albo na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób):

- pokrzywka
- świąd w miejscu podania
- wysypka w miejscu podania
- ból w miejscu podania

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób):

- reakcja anafilaktyczna
- zaburzenia sercowo-naczyniowe
- skurcz oskrzeli
- obrzęk naczynioruchowy
- obrzęk twarzy

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Procto-Glyvenol zawiera alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, może to powodować miejscową reakcję skórą
- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
- W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca
- Nie wolno stosować leku doustnie
- Należy unikać kontaktu z oczami

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- Leku Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży
- Lek Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego może być stosowany od 4 miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią, pod warunkiem nieprzekraczania zalecanych dawek

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek Procto-Glyvenol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Stosowanie u dzieci:

- Nie należy stosować leku Procto-Glyvenol u dzieci.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Romania Str.Stelutei nr. 28A Bukareszt Rumunia.

Importer równoległy:

- Pharmapoint SA Zbąszyńska 3 91-342 Łódź

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.