

Procto-Hemolan krem x 20g



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Tribenosidum, Lidocainum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Procto-Hemolan krem doodbytniczy - 20 g

(50 mg + 20 mg/g Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum monohydricum)

Opis produktu:

Procto-Hemolan krem doodbytniczy to lek na hemoroidy, który leczy i łagodzi objawy spowodowane żylakami odbytu

Skład:

Substancją czynną jest:

- tribenozyd (Tribenosidum)
- lidokaina (Lidocaini hydrochloridum)

substancje pomocnicze:

- alkohol cetylowy, kwas stearynowy, parafina ciekła, izopropylu palmitynian, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu stearynian, metylu parahydroksybenzoesan , propylu parahydroksybenzoesan sorbitol, ciekły niekryształizujący, woda oczyszczona

1 g kremu zawiera:

- 50 mg tribenozydu

- 20 mg chlorowodorku lidokainy

Wskazania:

- Żyłki odbytu - zewnętrzne i wewnętrzne

Działanie:

W swoim składzie zawiera:

- **lidokainę** - która działa silnie znieczulająco, dzięki czemu bardzo szybko łagodzi najbardziej dokuczliwe objawy: ból, pieczenie i swędzenie.
- **tribenozyd** - zmniejsza stan zapalny obecny przy hemoroidach, ogranicza przepuszczalność naczyń krwionośnych i wpływa na poprawę napięcia ściany naczyniowej. W niewielkim stopniu przeciwdziała także zakrzepom. W ten sposób zwalcza przyczyny dolegliwości i zabezpiecza przed ich ponownym wystąpieniem.
- Substancje zawarte w kremie działają miejscowo i nie uwalniają się do krążenia ogólnego.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek stosować doodbytniczo
- Za pomocą dołączonego do opakowania aplikatora należy nałożyć krem w ilości ok. 1cm na chorobowo zmienione miejsce
- Stosować 2 razy na dobę, rano i wieczorem
- Po ustąpieniu ostrych objawów lek można stosować 1 raz na dobę
- Przystępując do aplikacji kremu należy dokładnie umyć okolice odbytu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- w przypadku gdy pacjent wykazuje nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające (np. stosowane do znieczuleń w stomatologii)

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10000):

- uczucie lekkiego pieczenia
- ból

- nasilona perystaltyka jelit

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- nie są znane przypadki wzajemnego oddziaływania między podawanym doodbytniczo lekiem ProctoHemolan, a innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpiła poprawa lub objawy nasiliły się, należy skonsultować się z lekarzem
- Podczas stosowania leku należy zapobiegać zaburzeniom wypróżniania
- Lek zawiera alkohol cetylowy, który może powodować miejscową reakcję skórą, np. kontaktowe zapalenie skóry
- Lek zawiera parahydroksybenzoesan metyli i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne, również typu późnego

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.