

Proktosedon maść doodbytnicza 15g



Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polmex
Substancja czynna	Cinchocainum, Aesculinum, Hydrocortisonum, Neomycinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Proktosedon maść - 15 g

(Hydrocortisonum, Cinchocaini hydrochloridum, Esculinum, Neomycini sulfas)

Opis produktu:

Maść Proktosedon jest wskazana w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych odbytu, szczeliny odbytu i świądu odbytu. Może być stosowana w okresie przed- i pooperacyjnym

Skład:

Substancją czynną jest :

- **hydrokortyzon** w postaci octanu (Hydrocortisonum) 5 mg
- **chlorowodorek cynchokainy** (Cinchocaini hydrochloridum) 5 mg
- **siarczan neomycyny** (Neomycini sulfas) 10 mg
- **eskulina** w postaci półtorawodzianu (Esculinum) 10 mg

Substancje pomocnicze:

- parafina ciekła

- wazelina biała
- lanolina bezwodna

Wskazania:

- Wspomagająco w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu (hemoroidom), takich jak: ból, pieczenie i świąd

Działanie:

- **hydrokortyzon** - działa przeciwzapalnie
- **cynchokaina** - działa znieczulająco
- **neomycyna** - antybiotyk o szerokim spektrum działania, który leczy miejscowe zakażenia wywołane przez gronkowce i wrażliwe bakterie Gram-ujemne oraz pozwala zapobiegać wtórnym zakażeniom
- **eskulina** - hamuje krwawienia z naczyń i zmniejsza obrzęki

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- U dorosłych zwykle stosuje się maść przez trzy do sześciu dni, do ustąpienia stanu zapalnego.
- Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób stosowania:

- za pomocą aplikatora nakładać niewielką ilość maści do odbytu i na zewnątrz, rano i wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- stwierdzona u pacjenta cukrzyca, gruźlica, jaskra, osteoporoza, ostra psychoza, zakażenie grzybicze lub wirusowe lub zakrzepica żylna.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sporadycznie występujące działania niepożądane:

- pieczenie odbytu (szczególnie gdy naskórek jest uszkodzony)

Częstość nieznaną:

- nieostre widzenie

Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe charakterystyczne dla steroidów (w leku występuje hydrokortyzon)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Proktosedon z którymkolwiek z niżej wymienionych leków, w tym:

- niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub kwasu acetylosalicylowego
- fenytoiny
- szczepionki, żywych wirusów lub innego szczepienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli równolegle z hemoroidami występują: zakażenia, alergia
- Jeśli pacjent przyjmuje szczepienia lub leczenia immunizacyjne - nie stosować tego leku
- W przypadku wystąpienia podrażnienia, krwawienia, stosowanie leku należy przerwać
- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z wystąpieniem ogólnoustrojowych działań korykosteroidów
- W przypadku nieostrego widzenia lub innych zaburzeń widzenia, należy skontaktować się z lekarzem

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku
- Leku nie stosować w okresie karmienia piersią ze względu na wpływ hydrokortyzonu na wzrost dziecka

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Polmex Pharma Biniecki & Malinowski sp. j. ul. Pokorna 2 lok. 1027 00-199 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.