

## Pyralgina 500 mg, lek przeciwbólowy, 50 tabletek



Cena: 47,99 PLN

### Opis słownikowy

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Producent / Marka | Polpharma   |
| Substancja czynna | Metamizolum |
| Typ produktu      |             |

### Opis produktu

## Produkt leczniczy bez recepty

## Pyralgina 500 mg - 50 tabletek

## (500 mg Metamizolum natrium)

### Opis produktu:

Lek Pyralgina należy do nieopiodowych leków przeciwbólowych z grupy pochodnych pirazolonu o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Działa również rozkurczowo na mięśnie gładkie.

### Skład:

- Substancją czynną jest - metamizol sodowy (Metamizolum natrium).
- Substancje pomocnicze - skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian.

1 tabletkę zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego.

### Wskazania:

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

## Działanie:

- **Pyralgina** zawiera **metamizol sodowy**, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz rozkurczowe na mięśnie gładkie.
- **Metamizol** należy do nieopiodowych leków przeciwbólowych z grupy pochodnych pirazonu.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania doustnego.
- Tabletki należy przyjmować popijając wystarczającą ilością wody.
- Lek stosować w trakcie lub po posiłku.

**Osoby dorosłe:** bóle sporadyczne i gorączka: 1 tabletka (500 mg) do 2 tabletek (1000 mg).

- Maksymalna dawka jednorazowa to 2 tabletki (1000 mg metamizolu).
- Maksymalna dawka dobową to 6 tabletek (3000 mg metamizolu).
- Nie stosować leku dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

**Dawkowanie leku należy dostosować w przypadku:**

- pacjentów w podeszłym wieku, osób z obniżonym klirensiem kreatyniny,
- zaburzeń czynności wątroby i nerek.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

**Nie stosować leku Pyralgina jeśli:**

- jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol, inne pochodne pirazonu i pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występuje zespół astmy analgetycznej lub znana nietolerancja na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym (obrzękiem w obrębie języka, twarzy, warg i (lub) gardła), tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopiodowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen;
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po zastosowaniu leków obniżających odporność organizmu) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia) lub pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość;
- jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa;
- jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);

- jeśli pacjent stosuje lek z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon);
- jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Ze względu na zagrożenie życia lek należy natychmiast odstawić i wezwać pomoc lekarską w razie pojawienia się ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych):**

- rzadko występujący obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania;
- bardzo rzadko występujący ciężki skurcz oskrzeli;
- zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka;
- wstrząs anafilaktyczny (zagrożające życiu zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, omdlenie) – częstość nieznaną.

**Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):**

- wysypka polekowa (przemijająca wysypka),
- nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

**Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):**

- leukopenia (spadek liczby białych krwinek),
- zmiany skórne (grudkowo-plamkowe).

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):**

- małopłytkowość (krwawienia, krwiaki),
- astma analgetyczna, napady astmy,
- ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek,
- białkomocz, skąpomocz, bezmocz.

**Częstość nieznaną:**

- bóle i zawroty głowy,
- wymioty, nudności, biegunka, podrażnienie żołądka, bóle brzucha,
- czerwone zabarwienie moczu (po wysokich dawkach metamizolu),
- uszkodzenie wątroby.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Pyralgina może wchodzić w interakcję z:

- lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny,
- lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. kaptopryl),
- lekami moczopędnymi,
- doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi,
- fenytoiną,
- sulfonamidami,
- barbituranami (fenobarbital),
- inhibitorami MAO (monoaminooksydazy),
- litem,
- chlorpromazyną,
- metotreksatem.

Stosowanie leku **Pyralgina** jest przeciwwskazane z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, propyfenazon).

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek **Pyralgina** zawiera sól.
- **Zastosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku:** chorób serca, zaburzeń krążenia, wysokiej gorączki, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, chorób uczuleniowych (pokrzywka, atopowe), nietolerancji niektórych barwników (tartrazyna) lub konserwantów (benzoesany).
- **Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia:** agranulocytozy, małopłytkowości, pancytopenii, ciężkiej choroby alergicznej.

### Ciąża i karmienie piersią:

- Stosowanie leku w ciąży oraz w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- **Pyralgina** nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci i młodzieży.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- W zalecanym zakresie dawkowania nie zaobserwowano upośledzenia zdolności koncentracji i reagowania. Jednak w przypadku stosowania wyższych dawek należy zachować ostrożność i zrezygnować z obsługi maszyn, prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności obciążonych ryzykiem.

#### Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Alkohol może wpływać na skuteczność leku.

#### Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

#### Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

#### Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.