

# Ranigast S-O-S Mleczko 200 ml



Cena: 19,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Ranigast, S-O-S mleczko, butelka, 200 ml

ZAWIESINA DOUSTNA

#### Wskazania:

- wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak: zgaga oraz ból brzucha.
- umożliwia zmniejszanie nadkwaśności, zapobiegając wystąpieniu uczucia pieczenia, bólu brzucha i niestrawności.
- jest skuteczny niezależnie od zasadniczej przyczyny problemu.
- można stosować go wspomagająco u pacjentów z zapaleniem żołądka.

#### Działanie:

- zawiera połączenie kilku substancji działających synergistycznie w środowisku żołądka.

- **alginian sodu** oraz **wodorowęglan potasu i węglan wapnia** umożliwia jego szybkie działanie.
- **alginiany** to polisacharydy uzyskiwane z niektórych gatunków alg morskich. Występują w postaci włókien, które w reakcji z kwaśnym środowiskiem żołądka, szybko ulegają żelifikacji. Powstały żel tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej żołądka.
- połączenie węglanu i wodorowęglanu neutralizuje kwasotę soku żołądkowego.
- ponadto pęcherzyki dwutlenku węgla, które powstają w wyniku reakcji z kwasem solnym zostają uwięzione w żelu alginianowym. Przekształca się on w piankę unoszącą się na powierzchni soku żołądkowego i tworzącą barierę, która zmniejsza liczbę epizodów refluksu

## Sposób użycia:

### Dorośli i młodzież (12–18 lat):

- zalecane dzienne dawkowanie to 1 łyżka stołowa (około 15 ml) po dwóch głównych posiłkach w ciągu dnia i przed snem, do momentu ustąpienia objawów.

### Dzieci (9-12 lat):

- 2 łyżeczki (około 10 ml) po dwóch głównych posiłkach w ciągu dnia i przed snem do momentu ustąpienia objawów.

### Dzieci (6-9 lat):

- 1 łyżeczka (około 5 ml) po dwóch głównych posiłkach w ciągu dnia i przed snem do momentu ustąpienia objawów.

Jeśli po miesiącu stosowania produktu problem nadal występuje, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawki te skutecznie zmniejszają kwasotę soku żołądkowego i zapobiegają refluksowi żołądkowo-przełykowemu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

## Skład:

alginian sodu, węglan wapnia, wodorowęglan potasu.

**Substancje pomocnicze:** wyciąg z imbiru (aromat), olejek eteryczny z imbiru (aromat), aromaty anyżu i mleka, woda, karbomer, parahydroksybenzoesan metylowo-sodowy, sukraloza

### Zawartość w 15 ml/ 1 łyżce

- alginian sodu 410 mg
- węglan wapnia 51 mg
- wodorowęglan potasu 205 mg

## Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.

- nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- wyrób należy przechowywać w temperaturze od 15? do 25?

## Środki ostrożności:

- produkt zawiera substancje, które są naturalne i uważane za bezpieczne
- po zastosowaniu dawek niezbędnych do osiągnięcia efektu terapeutycznego jedynymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi mogą być zaparcie i przemijające nudności.
- jeśli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.
- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- u dzieci i młodzieży (6–18 lat) produkt można stosować tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne i po konsultacji z lekarzem.
- w okresie ciąży lub karmienia piersią produkt należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- nie przekraczać zalecanej dawki, ponieważ większe ilości mogą doprowadzić do zaparcia lub przemijającej biegunki.
- stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku przewlekłych zaparć lub biegunki, choroby nerek lub przewlekłej niewydolności serca.
- nie należy stosować produktu dłużej niż przez 30 kolejnych dni, jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.
- nie przyjmować w przypadku nietolerancji produktu.
- nie przyjmować w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na składniki produktu.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować po upływie 3 miesięcy od otwarcia opakowania

Objętość netto: 200 ml

## Producent:

SIIT srl Via Ariosto 50/60 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), WŁOCHY

## Dystrybutor:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański