

# Ranloc Med, 20mg, zgaga, Pantoprazolum, 14 tabletek dojelitowych



Cena: 8,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Ranbxy
Substancja czynna	Pantoprazolum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Ranloc Med, 20 mg - 14 tabletek dojelitowych

## (Pantoprazolum)

## Opis produktu:

Tabletki dojelitowe Ranloc Med to lek zmniejszający ilość kwasu w żołądku. Lek zawiera pantoprazol, z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP), i może być stosowany w krótkotrwałym leczeniu **reflusu** czy **zgagi**, **kwaśnego odbijania** u dorosłych.

## Skład:

Substancją czynną leku jest pantoprazol.

**Substancje pomocnicze:** Rdzeń tabletki: sodu węglan bezwodny, mannitol (E 421), krospowidon typu A, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza, glikol propylenowy, powidon K30, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172). Otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

1 tabletki dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

## Wskazania:

- Ranloc Med stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

## Działanie:

- Ranloc Med zawiera pantoprazol, należący do inhibitorów pompy protonowej (IPP), którego działanie polega na zmniejszeniu ilości wydzielanego kwasu w soku żołądkowym.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- **Należy przyjmować 1 tabletkę dziennie.**
- Tabletkę należy przyjąć przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Nie należy jej żuć ani rozgryzać.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej pantoprazolu wynoszącej 20 mg.
- Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni.
- Stosowanie leku należy zakończyć po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania pantoprazolu, jednak lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.
- Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku nieprzerwanie przez 2 tygodnie objawy nie ustąpią.
- Nie należy przyjmować pantoprazolu dłużej niż przez 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

- Nie stosować Ranloc Med u osób uczulonych na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- **Niezbyt często** (występują u 1 do 10 osób na 1 000): ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia z oddawaniem wiatrów, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka lub pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie lub ogólne złe samopoczucie, zaburzenia snu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych stwierdzona w badaniu krwi;
- **Rzadko** (występują u 1 do 10 osób na 10 000): ciężkie reakcje uczuleniowe, zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzone w badaniach krwi);
- **Bardzo rzadko** (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): zaburzenia orientacji; zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom;
- **Częstość nieznana**: ciężkie reakcje skórne, zażółcenie skóry i białkówki oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby) lub problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu i bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką, omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów, u których takie objawy wystąpiły już wcześniej); zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli: pacjent jest już leczony z powodu zgagi, w wywiadzie pojawia się choroba wrzodowa żołądka lub operacja żołądka, występują zaburzenia pracy wątroby, występowała kiedykolwiek reakcja skórna po podaniu pantoprazolu lub innego leku z grupy inhibitorów pompy protonowej, pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów proteazy wirusa HIV.

- Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 4 tygodnia oraz 2 tygodnie w przypadku jeśli objawy nie ustępują.
- Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z ograniczonym wchłanianiem witaminy B12, obniżeniem stężenia magnezu we krwi.
- Jeśli podczas stosowania tego leku wystąpią: nieplanowana utrata masy ciała, wymioty z krwią lub wymioty nawracające, krew w kale, smoliste stolce, bledność i osłabienie, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, ciężkie biegunki, należy skontaktować się z lekarzem w celu dalszej diagnostyki.
- Lek nie jest przeznaczony do natychmiastowego łagodzenia objawów zgagi. Nie należy stosować go zapobiegawczo.
- Ranloc Med w razie konieczności może być stosowany razem z lekami zobojętniającymi (wodorowęglan sodu, wodorotlenek glinu, węglan magnezu).

### Dzieci i młodzież:

- Leku Ranloc Med nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

### Ciąża, karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

### Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Tabletki należy połykać w całości przed posiłkiem, popijając płynem.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ranloc Med może wchodzić w interakcje z:

- inhibitorami proteazy wirusa HIV,
- ketokonazolem,
- warfaryną,
- metotreksatem,
- innymi lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej,
- antagonistami receptora H2 (ranitydyna, famotydyna).

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy Sp. z o.o., Kubickiego 11, Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd,

poinformuj nas o tym.