

## Rapidentin, płyn stomatologiczny na ból zęba, 5ml



Cena: 25,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Szygium aromaticum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Rapidentin płyn stomatologiczny na ból zęba - 5 ml

(Caryophylli floris aetheroleum)

### Opis produktu:

Rapidentin to tradycyjny lek roślinny do tymczasowego złagodzenia bólu zęba.

### Skład:

- Substancja czynna - Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy).
- Substancje pomocnicze - Nie zawiera.

1 ml płynu zawiera 1 ml olejku eterycznego goździkowego.

### Wskazania:

Tymczasowe złagodzenie bólu zęba.

## Działanie:

Produkt leczniczy Rapidentin działa uśmierniająco w razie bólu zęba.

## Stosowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i osoby w podeszłym wieku** - Wacik lub patyczek higieniczny należy nasączyć nierozcieńczonym lekiem i przyłożyć go do bolącej części zęba. Aplikację leku można powtórzyć po 20 minutach, a następnie co 2 godziny, jeśli to konieczne.

- Należy unikać kontaktu leku z dziąsłami, aby nie doszło do podrażnienia błony śluzowej.
- Nie stosować dłużej niż przez 7 dni. Stosowanie olejku goździkowego jest tylko tymczasowym rozwiązaniem w uśmierzaniu bólu zęba. Należy zwrócić się do dentysty tak szybko, jak to możliwe.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana: podrażnienie błony śluzowej i reakcje alergiczne.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Unikać kontaktu leku z dziąsłami.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

## Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

## Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu