

Remifemin x 60 tabletek



Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG
Substancja czynna	Cimicifuga
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Remifemin, na menopauzę, 60 tabletek

(Cimicifugae racemosae rhizomae extractum fluidum (0,78 - 1,14:1) isopropanolicum 40% (v/v))

Remifemin to roślinny lek w postaci tabletek, przeznaczony dla kobiet w okresie menopauzy

Preparat łagodzi takie dolegliwości jak: **przyływy uczucia gorąca oraz nadmierne pocenie się**

Skład:

- **Substancją czynną leku jest** - wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej (Cimicifugae racemosae rhizomae extractum fluidum (0,78 - 1,14:1) isopropanolicum 40% (V/V))
- **Substancje pomocnicze** - celaktoza (celuloza sproszkowana i laktoza jednowodna), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, olejek miętowy

1 tabletkę zawiera 0,018-0,026 ml powyższego wyciągu

Wskazania:

- łagodzenie dolegliwości w okresie menopauzy, takich jak: **uczucie przyływu gorąca oraz nadmierne pocenie się**

Działanie:

- zawiera pluskwicę groniastą, która łagodzi objawy związane z okresem menopauzy jak uderzenia gorąca i pocenie się

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dorosłych kobiet to:

- 2 razy dziennie po 1 tabletkę (rano i wieczorem)

lek do stosowania doustnego

działanie terapeutyczne leku pojawia się zwykle po 2 tygodniach regularnego stosowania

lek powinien być stosowany kilka miesięcy, aczkolwiek nie dłużej niż 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

- lek nie ma zastosowania u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat

Przeciwwskazania:

- nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu
- jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka)
- skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, swędzenie, wysypka)
- obrzęk twarzy i obrzęki obwodowe
- przyrost masy ciała

Częstość nieznaną:

- hepatotoksyczność (w tym zapalenie wątroby, żółtaczkę, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych) produktów zawierających pluskwicę

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ciąża, karmienie piersią:

- bezpieczeństwo stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone
- nie należy przyjmować leku w okresie ciąży i karmienia piersią
- wpływ leku na płodność nie jest znany
- kobiety w wieku rozrodczym powinny rozważyć stosowanie skutecznej antykoncepcji
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku

Lek zawiera laktozę:

- jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 35 38259 Salzgitter, Niemcy

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.