

Reparil 20mg, lek na obrzęki po urazach, 40tabletek, Inpharm



Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Inpharm

Substancja
czynna Escinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Reparil, 20 mg - 40 tabletek dojelitowych

(Escinum)

Importer Równoległy: Inpharm

Opis produktu:

Reparil N Gel to produkt leczniczy stosowany w obrzękach po miejscowych urazach - stłuczeniach, krwiakach, zgnieceniach, urazach stawów.

Składniki:

- **Substancja czynna** - escyna (Escinum)
- **Substancje pomocnicze** - laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian; skład otoczki: sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudragit L 100-55), makrogol 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, symetykon emulsja, wosk biały, wosk Carnauba

1 tabletkę zawiera 20 mg escyny.

Wskazania:

- Leczenie wspomagające obrzęków po miejscowych urazach towarzyszących stłuczeniu, krwiakom, zgnieceniom, urazom stawów.

Działanie:

- **Escyna** działa w obrębie ściany naczynia, hamuje wysięk, przyspiesza zmniejszanie się obrzęku. Dodatkowo **escyna** wzmacnia odporność naczyń włosowatych, poprawia mikrokrążenie, hamuje procesy zapalne.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli i młodzież od 14 lat:** 2 tabletki 3 razy na dobę.
- **Dorośli i młodzież od 14 lat (dawka podtrzymująca lub lekkie przypadki):** 1 tabletki 3 razy na dobę.
- **Dzieci od 7 do 14 lat:** 1 tabletki 2-3 razy na dobę.
- Lek do stosowania doustnego.
- Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na escynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- jeśli u pacjenta występuje niewydolność lub zaburzenia nerek,
- u dzieci w wieku poniżej 7 lat,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości np. pokrzywka.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Reparil może wchodzić w interakcje z:

- lekami o działaniu przeciwzkrzepowym,
- antybiotykami aminoglikozydowymi,
- ampicylina, cefalotyna

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, lek **Reparil** należy odstawić.
- **Reparil** zawiera laktozę jednowodną i sacharozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i brak danych z badań na zwierzętach, nie należy stosować leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan, Wiedeń, Austria

Importer Równoległy

InPharm , Strumykowa 28/11, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.