


Reparil N, żel, stłuczenie, krwiaki, siniaki, 40g



Cena: 34,85 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Mylan
Substancja czynna	Escinum, Diethylaminum
Typ produktu	

Opis produktu

Reparil Gel N, żel - 40 g

(Escinum, Diethylaminum)

Opis produktu:

Reparil N Gel to produkt leczniczy stosowany w leczeniu wspomagającym w urazach - stłuczeniach, krwiakach, zgnieceniach, urazach stawów.

Składniki:

- **Substancja czynna** - escyna (Escinum) i salicylan dietyloaminy (Diethylamini salicylas).
- **Substancje pomocnicze** - olejek lawendowy, olejek kwiatu pomarańczy, karbomer (kwas poliakrylowy), makrogol 6 (Softigen 767), wersenian disodowy, trometamol, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

100 g żelu zawiera 1 g escyny i 5 g salicylanu dietyloaminy.

Wskazania:

- Leczenie wspomagające stanów pourazowych towarzyszących stłuczeniu, krwiakom, zgnieceniom, urazom stawów.

Działanie:

- Reparil N Gel zawiera 2 substancje czynne - escynę i salicylan dietyloaminy - **przyspiesza wchłanianie obrzęków, zmniejsza**

przepuszczalność naczyń, hamuje procesy zapalne, działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Żel nakładać 1-3 razy dziennie na chore miejsce i jego okolicę. Stosować przez okres 1-2 tygodni (do ustąpienia objawów).
- Lek do stosowania miejscowego na skórę.
- Żel można rozsmarować na skórze lub wcierać.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- na otwarte rany, błony śluzowe, obszary skórne poddane promieniowaniu,
- w I trymestrze ciąży,
- w przypadku przewlekłej niewydolności nerek, chorobie nerek.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości w miejscu stosowania (zaczerwienienie skóry, wysypka, rumień, zapalenie skóry, złuszczenie skóry, pokrzywka).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie żelu **Reparil N** na duże powierzchnie ciała może powodować wystąpienie działań ogólnych na organizm - związane z wpływem na wątrobę, nerki, układ pokarmowy oraz ogólnoustrojowych - astma, reakcje nadwrażliwości.
- Osoby z nadwrażliwością na salicylany nie powinny stosować żelu bez porozumienia z lekarzem.
- Podczas stosowania żelu, należy unikać kontaktu z oczami.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Stosowanie w pierwszym trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym użyciu: 6 miesięcy
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan Healthcare Sp. Z o.o. Postępu 21B, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.