

Respero Myrtol 300mg x 20 kapsułek

Cena: 35,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Berlin-chemie
Substancja czynna	Distillant ex oleorum essentialium rectificati eucalypti, dulcis aurantiorum, myrti et citri
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Respero Myrtol - 20 kapsułek

Opis produktu:

Respero Myrtol to lek na bazie olejków eterycznych, który stosuje się do łagodzenia ostrych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

Skład:

- **Substancja czynna** - destylaty rektyfikowanych olejków eterycznych: **eukaliptusowy** (Eucalyptus globulus Labill. aetheroleum), **pomarańczy słodkiej** (Citrus sinensis L. aetheroleum), **mirtu** (Myrtus communis L. aetheroleum), **cytryny zwyczajnej** (Citrus limon L. aetheroleum)
- **Substancje pomocnicze** - Olej rzepakowy, rafinowany; żelatyna; glicerol 85% (E 422); sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420); kwas solny (13%); hypromelozy octano-bursztynian; trietylu cytrynian; talk; sodu laurylosiarczan; dekstryna; amonowy gliceryzyny

Jedna kapsułka zawiera 300 mg destylatu z mieszaniny rektyfikowanych olejków

Wskazania:

- łagodzenie objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych

Działanie:

- rozluźniająca śluz i ułatwiająca oczyszczanie ze śluzu górnych dróg oddechowych
- ma działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 roku życia:

- 1 kapsułkę 3-4 razy na dobę
- przyjmować bez rozgryzania, na około 30 minut przed posiłkiem, z dużą ilością płynu
- ostatnia dawka może zostać przyjęta przed snem
- jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na składniki czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą oraz w stanach zapalnych przewodu pokarmowego i dróg żółciowych i ciężkich schorzeniach wątroby

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

- dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. ból brzucha/uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu
- rzadkie przypadki nudności, wymiotów lub biegunki

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- reakcje nadwrażliwości (np. wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy, duszność lub zaburzenia krążenia krwi)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

- kamienie obecne w nerkach lub drogach żółciowych mogą ulec przemieszczeniu

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- zastosowanie leku u pacjentów ze znaczną nadwrażliwością układu oddechowego, astmą oskrzelową, czy chorującym na koklusz, pojawienie się gorączki, duszności, wydzieliny z krwią lub ropą lub brak poprawy wymaga konsultacji z lekarzem
- **lek zawiera sorbitol** Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.
- lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG Kieler Straße 11 25551 Hohenlockstedt Niemcy

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

