

Rivel, odkażanie skóry i błony śluzowych, żel 30g



Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa
Substancja czynna	Ethacridini lactas
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Rivel, 5mg/g żel - 30g

(Ethacridini lactas)

Opis produktu:

- Lek Rivel jest żelem do stosowania miejscowego o działaniu przeciwbakteryjnym i łagodzącym dolegliwości bólowe i stan zapalny.

Skład:

- Substancją czynną leku jest mleczan etakrydyny 5 mg/g.
- Pozostałe składniki to: etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Wskazania:

Lek Rivel stosuje się miejscowo:

- w odkażaniu skóry i błon śluzowych;
- we wspomagającym leczeniu zakażeń skóry wywołanych głównie przez bakterie Gram-dodatnie (czyraki, czyraki mnogie,

ropnie), mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych);

- po ukąszeniu owadów.

Działanie:

- Rivel jest żelem do stosowania miejscowego. W skład leku wchodzi substancja czynna – mleczan etakrydyny.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę lub błony śluzowe.
- Należy nakładać cienką warstwę leku na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe 2-3 razy na dobę (w razie potrzeby częściej).
- Lek może być stosowany pod opatrunek.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.

Przeciwwskazania:

-

Nie stosować leku **Rivel** jeśli pacjent ma uczulenie na mleczan etakrydyny, inne pochodne akrydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Rzadko** (rzadziej niż u 1 na 1000 osób) może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd, wysypka) oraz miejscowe odczyny alergiczne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.
- Nie należy stosować na błonę śluzową jamy ustnej.
- Lek Rivel zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Lek Rivel może być stosowany u kobiet w ciąży lub karmiących piersią wyłącznie w przypadku, gdy lekarz zdecyduje, że jest to konieczne.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Podmiot odpowiedzialny:

Bausch Health Ireland Ltd. Dublin, Islandia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym