

## Rostil 250 mg, żylaki obrzęki, 30 tabletek



Cena: 11,90 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Calcii dobesilas
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

### Rostil 250 mg - 60 tabletek

### (Calcii dobesilas monohydricus)

### Opis produktu:

Rostil jest lekiem w postaci tabletek. Zawiera substancję czynną wapnia dobezytan jednowodny, która działa na nabłonek naczyń włosowatych, ściany żył oraz naczynia limfatyczne.

### Skład:

- **Substancją czynną leku jest** - wapnia dobezytan jednowodny.
- **Substancje pomocnicze** - laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, krospowidon.

Jedna tabletkę zawiera 250 mg wapnia dobezytanu jednowodnego.

### Wskazania:

Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki):

- ból,
- kurcze,
- mrowienie,
- obrzęk,
- zmiany skórne na tle zastoju krwi.

## Działanie:

- Lek zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych, zwiększa ich wytrzymałość zapobiegając tworzeniu wysięków i usprawniając mikrokrążenie.
- Lek zwiększa napięcie ściany żył co zapobiega powstawaniu zastoju i zakrzepów w naczyniach żylnych.
- Nasila syntezę kolagenu, zmniejsza lepkość osocza zwiększając jego przepływ przez tkanki obwodowe.
- Działa uszczelniająco na naczynia w obrębie układu limfatycznego powodując zmniejszenie obrzęków, co prowadzi do ustąpienia dolegliwości bólowych i uczucia ciężkości kończyn.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli** - od 500 mg (2 tabletki) do 1000 mg (4 tabletki) na dobę, tj. 2 tabletki 1 – 2 razy na dobę.

Lek do podawania doustnego.

Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Leczenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:**

**Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):**

- nudności i biegunka;
- zawroty głowy;
- gorączka polekowa.

**Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):**

- agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów – jednego z rodzaju białych krwinek, powodujące większą podatność na zakażenia);
- swędząca wysypka z rumieniem.

Powyższe dolegliwości ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

**Interakcje:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rostil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;
- jeśli pacjent ma przewlekłe nawracające nieżytowe zapalenie żołądka;
- jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy.

Lek Rostil zawiera laktozę.

**Ciąża i karmienie piersią:**

- Lek nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.
- Nie wolno stosować leku w pierwszym trymestrze ciąży.
- Lek może być stosowany w ciąży jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

**Stosowanie leku z jedzeniem i pićem:**

- Lek należy przyjmować podczas posiłku.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

- Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.