

Rowatinex, 50 kapsułek Inpharm



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Rowatinex - 50 kapsułek Import InPharm

- Import równoległy - InPharm
- Kraj - Austria

Opis produktu:

Rowatinex to produkt leczniczy o działaniu moczopędnym, łagodnie rozkurczającym drogi moczowe do stosowania w przypadku drobnych kamieni nerkowych.

Skład:

- **Substancje aktywne** - alfa-pinenum, beta-pinenum, camphenum, cineolum, fenchonum, borneolum, anetholum.
- **Substancje pomocnicze** - olej z oliwek; powłoczka kapsułki: żelatyna wołowa, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy, żółcień pomarańczowa FCF (E 110), żółcień chinolinowa WS 70% (E 104).

1 kapsułka zawiera:

- alfa-pinenum - 24,8 mg,
- beta-pinenum - 6,2 mg,

- camphenum - 15 mg,
- cineolum - 3 mg,
- fenchonum - 4 mg,
- borneolum - 10 mg,
- anetholum - 4 mg.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania doustnego.
- Lek przyjmować 30 minut przed posiłkiem.
- Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Dorośli: 1 kapsułka 3-4 razy na dobę.

Wskazania:

Leczenie pomocnicze w małych złożach kamieni nerkowych (tzw. "piasek nerkowy").

Działanie:

- Rowatinex wykazuje działanie moczopędne i łagodnie rozkurczające.
- Lek zawiera związki terpenowe, które zwiększają rozpuszczalność soli wapnia.
- Dodatkowo Rowatinex posiada właściwości przeciwbakteryjne.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- jeśli u pacjenta występują ostre lub przewlekłe schorzenia nerek.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- lekkie i przejściowe objawy ze strony żołądka, np. nudności,

- wymioty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy stosować ostrożnie jeśli podczas stosowania wystąpią: bóle w okolicy lędźwiowej, kolka nerkowa, zaburzenia w oddawaniu moczu, krwiomocz - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów, skontaktować się z lekarzem.
- Leku nie stosować w bezmocz, ciężkim zakażeniu dróg moczowych.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25oC.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- Należy pamiętać o konieczności przyjmowania zwiększonej ilości płynów niż zwykle.
- Lek przyjmować 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią:

- Tego leku nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- **Rowatinex** ze względu na zawartość olejków eterycznych może mieć wpływ na metabolizm innych leków, np. leków przeciwwzakrzepowych.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Podmiot odpowiedzialny:

Wobosan