

Sachodent, żel, do stosowania w jamie ustnej, 0,0871 g/g, 10g



Cena: 9,10 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Ziaja
Substancja czynna	Cholini salicylas
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Sachodent żel do stosowania w jamie ustnej 10 g

(Cholini salicylas)

Opis produktu:

Sachodent to lek w postaci żelu przeznaczony do stosowania w jamie ustnej w przypadku stanów zapalnych, podrażnień, uszkodzeń i owrzodzeń oraz w celu leczenia bólu.

Skład:

- **Substancja czynna** - choliny salicylan 87,1 mg,
- **Substancje pomocnicze** - etanol 96%, glicerol, hypromeloza 2910, sodu cyklaminian, olejek anyżowy, lewomentol, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 87,1 mg choliny salicylanu

Wskazania:

- Lek Sachodent stosuje się w leczeniu w obrębie jamy ustnej:
- ból, stanów zapalnych,
- podrażnień,
- uszkodzeń
- owrzodzeń

Działanie:

- Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz łagodząco.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli i młodzież powyżej 16 lat:
- Czystym palcem nanieść niewielką ilość, pasek żelu długości około 0,5-1 cm lub objętość ziarnka grochu na zmieniony chorobowo obszar błony śluzowej i delikatnie masować.
- Nie przekraczać ilości żelu zalecanej do pojedynczego podania.
- Stosować 3-4 razy na dobę.
- Jeśli to konieczne, w razie silnego bólu, dawkę można powtarzać co 2-3 godziny.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby 8-10 aplikacji na dobę.
- Żel można stosować przed posiłkami i przed snem.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
- Bez porozumienia z lekarzem lek można stosować przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

- W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Przedawkowanie salicylanami może pojawić się w trakcie stosowania wysokich dawek leku lub długotrwałego leczenia.
- Objawy przedawkowania to: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu, splątanie, senność, zwiększone pocenie się, wymioty, biegunka, gorączka, przyspieszony oddech.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku **Sachodent** :

- u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w przypadku choroby przebiegającej z gorączką.
- u pacjentów uczulonych na cholinę salicylan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- uczucie pieczenia błony śluzowej.

Następujące działania niepożądane są uważane jako wspólne dla grupy salicylanów:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- skurcz oskrzeli objawiający się trudnościami w oddychaniu, astma oskrzelowa;
- wrzód żołądka, wrzód dwunastnicy;
- zespół Reye'a (u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w przypadku choroby przebiegającej z gorączką);
- wydłużony czas krwawienia.

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
-

Salicylany mogą nasilać działanie leków rozrzedzających krew (przeciwzakrzepowych) oraz hamować działanie leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (zwiększających wydalanie kwasu moczowego).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Sachodent należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Jeśli ból jest ciężki i uporczywy lub jeśli objawom towarzyszy podwyższona temperatura ciała, należy skontaktować się z lekarzem.
- Bez porozumienia z lekarzem lek można stosować przez okres nie dłuższy niż 7 dni.
- W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Przedawkowanie salicylanami może pojawić się w trakcie stosowania wysokich dawek leku lub długotrwałego leczenia.
- Objawy przedawkowania to: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu, splątanie, senność, zwiększone pocenie się, wymioty, biegunka, gorączka, przyspieszony oddech.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Sachodent należy stosować ostrożnie i zgodnie z instrukcjami lekarza u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Sachodent nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dzieci i młodzież:

- Leku nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w przypadku choroby przebiegającej z gorączką.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 2 lata.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
- Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Masa netto: 10g

Podmiot odpowiedzialny:

Ziaja ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.