

Sachol, żel, stomatologiczny, przeciwbólowy, przeciwzapalny, afty, zapalenie dziąseł, 10g



Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Substancja czynna	Cholini salicylas, Cetalkonium
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Sachol 10 g

Żel stomatologiczny do stosowania w jamie ustnej i na dziąsła (Cholini salicylas, Cetalkonium)

Opis produktu:

Sachol żel stomatologiczny wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające. Efekty te są wynikiem aktywności poszczególnych składników leku:

Salicylan choliny – działa miejscowo przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo,

Chlorek cetalkoniowy – wzmacnia przeciwbólowe i przeciwzapalne działanie żelu,

Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu – wykazują działanie odkażające.

Skład:

- **Substancja czynna** - choliny salicylan i cetalkoniowy chlorek.
- **Substancje pomocnicze** - hydroksyetyloceluloza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glicerol,

olejek anyżowy, etanol 96%, woda oczyszczona

1 g żelu zawiera: 87,1 mg choliny salicylanu (Cholinisalicylas) i 0,1 mg cetalkoniowego chlorku (Cetalkoniichloridum).

Wskazania:

- Wskazaniami do zastosowania leku Sachol są stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej a także nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej.
- Żel można stosować w zapaleniu dziąseł czy chorobach przyzębia.

Działanie:

- Główny składnik leku – choliny salicylan działa miejscowo przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo. Cetalkoniowy chlorek wzmacnia działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne leku. Występujące w podłożu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan w stężeniach zawartych w leku wykazują działanie odkażające.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Żel stomatologiczny Sachol należy stosować od 2 do 3 razy na dobę.
- Sposób aplikacji: niewielką ilość żelu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsce i lekko wcierać przez około 2 minuty. Po zastosowaniu preparatu przez około pół godziny nie powinno się pić oraz spożywać pokarmów. Bezpośrednio po aplikacji żel utrzymuje się na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej przez kilka minut.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku, jeśli pacjent jest uczulony na choliny salicylan, cetalkoniowy chlorek, inne salicylany lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Działania niepożądane:

- Jak każdy lek, Sachol żel stomatologiczny może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed pierwszym zastosowaniem leku Sachol warto skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- W miejscu zastosowania leku może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.

- Nie stosować po upływie terminu ważności
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tubki wynosi 2 tygodnie.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie przeprowadzono badań określających czas i stopień wchłonięcia cholicy salicylanu do organizmu po miejscowym stosowaniu żelu na błonę śluzową jamy ustnej. Nie mniej jednak pochodne kwasu salicylowego są przeciwwskazane w III trymestrze ciąży.
- Pochodne kwasu salicylowego są wydzielane z mlekiem matki i nie zaleca się ich stosowania w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat. Natomiast u dzieci w wieku od 3 lat przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Sachol żel stomatologiczny nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Podczas miejscowego stosowania produktu leczniczego zgodnie z zaleconym dawkowaniem, nie istnieje ryzyko wystąpienia interakcji.
- Tylko w przypadku znacznego przedawkowania i pojawienia się objawów ogólnego działania cholicy salicylanu należy uwzględnić, że działa on synergicznie z innymi lekami przeciwzapalnymi, przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Sachol żel stomatologiczny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie zamrażać
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tubki wynosi 2 tygodnie.

Podmiot odpowiedzialny:

Bausch+Lomb Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.