

Salicylol, (50 mg + 950 mg)/g, płyn na skórę, 100g



Cena: 30,80 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Profarm
Substancja czynna	Acidum salicylicum, Ricinus communis
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Salicylol, (50 mg + 950 mg)/g, płyn na skórę, 100g

(Acidum salicylicum + Ricini oleum)

Opis:

- Salicylol jest olejowym roztworem kwasu salicylowego, o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i łagodnie keratolitycznym tzn. działającym rozpuszczająco na naskórek.

Skład:

- Substancjami czynnymi leku są kwas salicylowy oraz olej rycynowy.
- 1 g płynu zawiera; 50mg kwasu salicylowego i 950 mg oleju rycynowego

Wskazania:

- Wskazany jest szczególnie do leczenia łojotokowego zapalenia skóry, objawiającego się uporczywym łupieżem, zakażeń grzybiczych tj. grzybicy powierzchownej owłosionej skóry głowy, grzybicy skóry głowy z odczynem zapalnym, łupieżu pstrego. Pomocniczo w leczeniu trądziku.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Salicylol:

- jeśli pacjent jest uczulony na kwas salicylowy lub olej rycynowy,
- u dzieci do 3 roku życia,
- w ostrych stanach zapalnych skóry,
- na otwarte rany,
- na duże powierzchnie skóry,
- na błony śluzowe oczu, ust i nosa- w razie kontaktu z błonami śluzowymi lek zmyć ciepłą wodą.

Działanie:

- Salicylol jest olejowym roztworem kwasu salicylowego, o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i łagodnie keratolitycznym tzn. działającym rozpuszczająco na naskórek

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia

- Należy wcierać lek przy pomocy nasączonego zwitka waty w zmienioną chorobowo powierzchnię skóry głowy, odgarniając włosy. Głowę umyć po upływie 1 - 2 godzin. Zabieg powtórzyć kilka razy w odstępie 3 - 4 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy również zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salicylol

- Brak danych na temat przedawkowania leku stosowanego miejscowo.

Pominięcie zastosowania leku Salicylol

- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować leczenie jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku Salicylol

- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Dzieci

- Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- Salicylol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

- W trakcie stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć opinii lekarza.
- U niektórych osób w czasie stosowania leku Salicylol mogą wystąpić inne działania niepożądane.
- W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować

- Nie stosować jednocześnie z preparatami na skórę zawierającymi rezorcynę i riwanol ponieważ mogą pojawić się reakcje chemiczne pomiędzy kwasem salicylowym i wymienionymi składnikami.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, chronić od światła.
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84-300 Lębork

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.