

Scopolan 10mg x 30 drażetek



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Scopolamini butylbromidum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Scopolan 10 mg - 30 tabletek drażowanych

(Hyoscini butylbromidum)

Opis produktu:

Scopolan to produkt leczniczy stosowany w dolegliwościach skurczowych przewodu pokarmowego (skurcz żołądka, kolka jelitowa, kolka żółciowa, kolka nerkowa)

Składniki:

- Substancja czynna - butylobromek hioscyny
- Substancje pomocnicze - skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, guma arabska, sacharoza, talk, magnezu stearynian

1 tabletkę drażowaną zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum)

Wskazania:

- dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (skurcz żołądka, kolka jelitowa, Zespół Jelita Drażliwego), dróg żółciowych (kolka żółciowa)
- dolegliwości bólowe układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie, stany skurczowe związane z kamicą)

moczowodową)

Działanie:

- wykazuje działanie spazmolityczne na mięśniówkę gładką przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- **Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:** doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych 3 do 5 razy na dobę
- **Dzieci od 6 do 12 lat:** doustnie 1 tabletką drażowaną 2 razy na dobę

Lek do stosowania doustnego i doraźnego

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Kiedy nie stosować leku **Scopolan**:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych
- w przypadku uczulenia na alkaloidy tropanowe (np. atropina) i ich pochodne
- jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenną jelit, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardię, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego,
- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- rumień, pieczenie skóry, wysypka, pokrzywka, obrzęk
- suchość w jamie ustnej, zaparcia
- tachykardia, hipotensja

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- anuria, zaburzenia widzenia

Częstość nieznaną:

- reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **Scopolan** zawiera laktozę jednowodną i sacharozę - nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nietolerancją cukrów (nietolerancja fruktozy, galaktozy, brak laktazy)
- nie stosować w przypadku bólu brzucha o nieznanym przyczynie z towarzyszącą gorączką, nudnościami, wymiotami, zmianami rytmu wypróżnień, tkliwością brzucha, zmniejszeniem ciśnienia krwi, omdleniami, obecnością krwi w stolcu
- należy stosować ostrożnie w przypadku: choroby refluksowej przełyku, wrzodziejącego zapalenia jelit, choroby niedokrwiennej serca
- należy przerwać stosowanie produktu w przypadku wzrostu ciśnienia gałkowego lub zaburzeń ostrości widzenia
- lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Scopolan może wchodzić w interakcje z:

- TLPD (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), neuroleptykami, klozapiną, olanzapiną, inhibitorami MAO
- lekami przeciwhistaminowymi I-generacji
- innymi lekami o działaniu cholinolitycznym (ipratropium, tiotropium, pochodne atropiny)
- metoklopramidem
- lekami beta-adrenergicznymi

Ciąża i karmienie piersią:

- nie stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie stosować u dzieci poniżej 6 lat

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- lek może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej oraz zaburzenia wzroku

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień

podanego miesiąca

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Herbapol Wrocław Świętego Mikołaja 65/68 Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.