

Scopolan compositum rozkurczowy x 10 drażetek



Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Scopolamini butylbromidum, Metamizolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Scopolan compositum - 10 tabletek drażowanych

(Hyoscini butylbromidum 10mg + Metamizolum natriicum monohydricum 250 mg)

Opis produktu:

Scopolan Compositum jest produktem leczniczym stosowanym w bolesnych skurczach przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo-płciowego

Składniki:

- **Substancja czynna** - butylobromek hioscyny (Hyoscini butylbromidum) oraz metamizol sodowy jednowodny (Metamizolum natriicum monohydricum)
- **Substancje pomocnicze** - talk, guma arabska, żelatyna wieprzowa, glicerol, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171)

1 tabletkę drażowaną zawiera 10 mg butylobromku hioscyny i 250 mg metamizolu sodowego jednowodnego

Wskazania:

Scopolan compositum stosuje się w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o dużym nasileniu w stanach skurczowych:

- przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego)
- dróg żółciowych (np. kolka żółciowa)
- układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicią moczowodową, bolesne miesiączkowanie)

Scopolan compositum jest wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne

Działanie:

- **Scopolan compositum** jest lekiem złożonym
- Butylobromek hioscyny działa rozkurczająco
- metamizol sodowy przeciwbólowo i przeciwgorączkowo
- Lek znosi skurcze mięśni gładkich w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Zwykle stosowane dawka dla dorosłych to 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo

Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1-2 tabletki drażowane do 3 razy na dobę

- Lek należy stosować wyłącznie doraźnie (w przypadku wystąpienia dolegliwości)
- Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną
- Leku nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem
- Jeśli objawy się nasilą mimo stosowania leku, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Kiedy nie stosować leku Scopolan compositum:

- nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
- uczulenie na alkaloidy tropanowe i ich pochodne
- zmiany w obrazie morfologicznym krwi
- wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej
- ostra porfiria wątrobowa
- ostra niewydolność nerek lub wątroby
- jaskra z wąskim kątem przesączania

- rozrost prostaty
- niedrożność porażenna jelit
- zaparcia atoniczne
- zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka
- zwężenie szyi pęcherza moczowego
- tachykardia
- nużliwość mięśni (myasthenia gravis)
- patologiczne poszerzenie jelita grubego

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- rumień, pieczenie skóry, świąd, pokrzywka, obrzęk
- suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia
- tachykardia, hipotensja

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- uszkodzenie nerek, anuria
- zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozplywna martwica naskórka
- uszkodzenie czynności krwiotwórczej szpiku o podłożu alergicznym

Nieznana częstość występowania działań niepożądanych:

- reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny
- uszkodzenie wątroby

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie leku Scopolan compositum należy omówić z lekarzem, jeśli pacjent choruje na:

- chorobę refluksową przełyku (zarzucanie treści żołądkowej do przełyku), wrzodziejące zapalenie jelit, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy

- chorobę niedokrwinną serca, zwężenie ujścia mitralnego (jednej z zastawek w sercu)
- astmę oskrzelową lub inne choroby alergiczne (uczuleniowe), w tym atopowe, przewlekłą pokrzywkę, uczulenie na barwniki (np. tartrazynę) lub konserwanty (np. benzoesany)
- nietolerancję alkoholu objawiającą się kichaniem, łzawieniem oczu i silnym zaczerwienieniem twarzy w reakcji nawet na niewielkie ilości alkoholu, może to wskazywać na nierozpoznaną wcześniej astmę analgetyczną

Kiedy u pacjenta ból brzucha pojawił się nagle i nie jest znana jego przyczyna oraz jednocześnie występują: gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień (np. biegunka), ból podczas dotykania brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w kale, pacjent nie powinien zażywać leku bez zasięgnięcia porady lekarza. W celu zbadania przyczyny dolegliwości lekarz zaleci przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Scopolan compositum może wchodzić w interakcje z:

- trójpięścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
- inhibitorami MAO
- bupropionem
- neuroleptykami
- barbituranami
- fenytoiną
- niektórymi lekami przeciwhistaminowymi
- amantadyną
- lekami przeciwzakrzepowymi
- dizopiramidem
- innymi lekami cholinetycznymi (np. ipratropium, tiotropium)
- doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
- lekami blokującymi receptory dopaminowe
- lekami beta-adrenergicznymi
- sulfonamidami
- niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
- petydyną
- metotreksatem
- allopuryolem

- cyklosporyną

Ciąża i karmienie piersią:

- nie należy stosować leku **Scopolan compositum** w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie należy stosować leku **Scopolan compositum** u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, ponieważ lek może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej oraz zaburzenia wzroku

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Herbapol Wrocław Świętego Mikołaja 65/68 Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.