

## Scorbolamid, 40 tabletek



Cena: 21,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Scorbolamid
Substancja czynna	Salicylamidum, Rutosidum, Acidum ascorbicum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Scorbolamid, 300 mg + 100 mg + 5 mg - 40 tabletek drażowanych

(Salicylamidum + Acidum ascorbicum + Rutosidum)

### Opis produktu:

Scorbolamid to produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w przeziębieniu i grypie. Lek łagodzi ból różnego rodzaju pochodzenia oraz gorączkę.

### Skład:

- Substancja czynna - salicylamid, kwas askorbowy i rutozyd.
- Substancje pomocnicze - rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona; otoczka: sacharoza, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), воск Carnauba i woda oczyszczona.

1 tabletkę drażowaną zawiera:

- 300 mg - salicylamidu,
- 100 mg - kwasu askorbowego
- 5 mg - rutozydu.

## Wskazania:

- Gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą,
- bóle głowy,
- nerwobóle.

## Działanie:

- **Salicylamid** - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
- **Rutozyd** - wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem i dlatego witamina C dłużej działa.
- **Kwas askorbowy (witamina C)** - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie zakażeń.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek należy stosować doustnie.
- Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, albo popić szklanką wody lub mleka.

**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat** - zwykle 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

**Kiedy nie stosować leku Scorbolamid:**

- jeśli pacjent ma uczulenie na salicylamid, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma astmę z polipami nosa; - jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) stany zapalne przewodu pokarmowego;
- jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);
- jeśli pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;
- jeśli pacjent ma kamicę nerkową;
- jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa), niedokrwistość syderoblastyczną, nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;
- jeśli pacjentka jest w ciąży;
- jeśli pacjentka karmi piersią;

- u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstsze działania niepożądane występują ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

### Zaburzenia żołądka i jelit:

- nudności,
- wymioty,
- skurcze w obrębie jamy brzusznej,
- uczucie palenia za mostkiem,
- brak łaknienia,
- biegunka,
- podrażnienie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (nadżerki i owrzodzenia),
- suchość w ustach.

Nie obserwowano wyraźnego związku między stosowaniem salicylamidu i krwawieniem z przewodu pokarmowego.

### Zaburzenia układu nerwowego:

- zawroty głowy,
- senność,
- bóle głowy.

### Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- zaczerwienienie twarzy,
- wysypka,
- nadmierna potliwość.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Scorbolamid:

- jeśli pacjent ma astmę oskrzelową;
- jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lub nerek;
- u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej i krwawieniach z przewodu pokarmowego.

Lek Scorbolamid zawiera sacharozę i żółcień chinolinową (E104). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może powodować reakcje alergiczne.

#### Dzieci i młodzież:

- Nie stosować u dzieci poniżej 16 roku życia.

#### Stosowanie z jedzeniem i pićem:

- 

Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, albo z dużą ilością wody lub mleka. Alkohol może nasilać działania niepożądane.

#### Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Lek jest przeciwwskazany u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.