

Silimax, 70 mg, 36 kapsułek



Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Filofarm
Substancja czynna	Silymarinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Silimax 70 mg - 36 kapsułek

Opis produktu:

Silimax® jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby. Substancją czynną jest tutaj sylimaryna, czyli wyciąg z owocu ostropestu zawierający pochodne flawonolu (sylibininę, sylidiaminę i sylikrystynę).

Skład:

1 kapsułka zawiera:

- Substancja czynna - 70 mg sylimaryny,
- Składniki pomocnicze - laktoza jednowodna, magnezu stearynian,
- Skład kapsułki - żelatyna hydrolizowana, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).

Wskazania:

- Tradycyjnie w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych czynnikami toksycznymi np. alkoholem, środkami ochrony

roślin, a także po uszkodzeniach spowodowanych działaniem leków.

- Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Działanie:

Sylimaryna stabilizuje błony komórkowe komórek wątrobowych, a więc chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem substancji toksycznych. Silimax® stosuje się tradycyjnie w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych np. alkoholem, środkami ochrony roślin, toluenem, ksylenem, spożyciem ciężkostrawnych pokarmów, a także lekami.

Dawkowanie:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat - 1 kapsułka trzy razy na dobę (210 mg sylimaryny).

- Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą.
- Silimax® jest skuteczny w przypadku systematycznego stosowania.
- Okres stosowania leku należy skonsultować z lekarzem. Leczenie powinno trwać 4 tygodnie, a w stanach przewlekłych do 6 miesięcy.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Działanie nieporządane:

- Zaburzenia żołądka i jelit.
- Podczas stosowania dużych dawek leku może wystąpić słabe działanie przeczyszczające.
- U niektórych osób w czasie stosowania leku Silimax® mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Interakcje:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Leku nie należy stosować w leczeniu ostrych zatruc.
- Nie należy stosować leku Silimax®, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku lub na rośliny z rodziny Compositae.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Silimax®

W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenie skóry, zabarwienie na żółto białek oczu) należy zasięgnąć porady lekarza. W trakcie leczenia należy unikać kontaktu z substancjami toksycznymi dla wątroby np. alkoholu.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku Silimax® u dzieci

Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Stosowanie leku Silimax® u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM, ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.