

Simecol Forte 240, Symetykon, 30 kapsułek



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka RADA SP. Z O.O. SP.J.

Substancja
czynna -

Typ produktu

Opis produktu

Wyrób medyczny,

SIMECOL Forte 240, 30 kapsułek miękkich

Wskazania

SIMECOL Forte 240 to wyrób medyczny zalecany w przypadku wzdęć, uczucia pełności, nadmiernego gromadzenia się gazów i odbijania, a także dla pacjentów przed wykonaniem badań diagnostycznych jamy brzusznej.

Działanie

SIMECOL Forte 240 jest przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia, odbijania, dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują napięcie i ucisk w jelitach. SIMECOL Forte 240 przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej (ultrasonografii, endoskopii, radiografii i kolonoskopii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.

Skład wyrobu medycznego: zawartość składników: symetykon 240 mg w 1 kapsułce.

Składniki: symetykon, otoczka (żelatyna wieprzowa, glicerol).

Dawkowanie i sposób użycia

SIMECOL Forte 240 stosuje się doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody). W trakcie stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowanych.

Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach:

- Dorośli: doraźnie, 1 kapsułka, 2–4 razy dziennie; maksymalnie 4 kapsułki dziennie (960 mg symetykonu).
- Kobiety w ciąży: dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- Dzieci od 12. do 18. roku życia: doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

- Dorośli: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.
- Kobiety w ciąży: dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- Dzieci od 12. do 18. roku życia: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.

Wyrób może być stosowany u osób chorych na cukrzycę oraz u osób z zaburzeniami trawienia cukrów. Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Ze względu na działanie symetykonu i brak jego wchłaniania z przewodu pokarmowego do organizmu, nie są spodziewane szkodliwe skutki stosowania wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Pominięcie zastosowania wyrobu **SIMECOL Forte 240**: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Dawkę pojedynczą można uzupełnić w każdej chwili.

Środki ostrożności i przeciwwskazania

- Nie wolno stosować więcej niż 4 kapsułki dziennie u dorosłych i 1 kapsułkę dziennie u dzieci powyżej 12. roku życia.
- Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania wyrobu z innymi lekami, należy zachować co najmniej godzinną przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego **SIMECOL Forte 240** i innych preparatów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku jednoczesnego stosowania lewotyroksyny oraz symetykonu należy zachować 4-godzinny odstęp.
- Jeżeli objawy nasilają się lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak dostępnych danych na temat wpływu wyrobu na obsługę maszyn oraz kierowanie pojazdami.
- Kiedy nie stosować wyrobu medycznego **SIMECOL Forte 240**: w przypadku nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu; u dzieci w wieku poniżej 12. roku życia; w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.

Ważne informacje

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE1434
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent: Curtis Health Caps S.A., Wysogotowo, ul. Batorowska 52, 62-081 Przeźmierowo

Wyprodukowano dla: Noris Pharma AG, nGutenbergstrasse 1, mZürich, Szwajcaria

Dystrybutor: Rada Sp. z o.o., Sp. Jawna