

## Simegasin Forte 30 kapsułek miękkich



Cena: 10,50 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	CURTIS HEALTH CAPS S.A.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Simegasin forte 240 mg, 30 kapsułek miękkich

(Symetykon)

Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia.

### Skład:

Wyrób medyczny Simegasin forte zawiera 240 mg symetykonu w kapsułce żelatynowej.

Składniki otoczki: żelatyna wieprzowa, glicerol.

### Wskazania:

- łagodzenie uczucia pełności, uczucia wzdęcia,
- odbijanie,
- dolegliwości związane z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym,
- pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej (ultrasonografii, endoskopii, radiografii, kolonoskopii).

### Działanie:

Wyrób medyczny Simeticon forte:

- zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazów w jelitach, przez co ułatwia ich pękanie a następnie wydalania.
- wykazuje działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiegokolwiek reakcje chemiczne.
- jest substancją farmakologicznie i fizjologicznie obojętną.

## Sposób użycia wyrobu medycznego:

Kapsułki stosuje się doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu ( np.1 szklanka wody).

**W trakcie stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowanych.**

**Objawy związane z uciskiem i napięciem w jelitach:**

- **Dorośli:** doraźnie 1 kapsułka 2-4 razy dziennie. Maksymalnie 4 kapsułki dziennie ( 960 mg symetykonu)
- **Kobiety w ciąży:** dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- **Dzieci od 12 do 18 roku życia:** doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

**Przygotowanie do badań diagnostycznych:**

- **Dorośli:** 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.
- **Kobiety w ciąży:** dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- **Dzieci od 12 do 18 roku życia:** 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.
- Nie stosować w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutom.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Wyrób może być stosowany u osób chorych na cukrzycę oraz u osób z zaburzeniami trawienia cukrów.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze 15-25 stopni, w oryginalnym opakowaniu
- Chronić od światła i wilgoci.
- Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na blistrze oraz opakowaniu zewnętrznym.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie **CE1434**
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

Curtis Health Caps.S.A.Wysogotowo ul.Batorowska 52 62-081 Przeźmierowo.

## Dystrybutor:

Medicinae Sp. z o.o. ul.Zbąszyńska 3 91-342 Łódź.