

Sinecod, syrop przeciwkaszlowy, 1,5 mg/ml, 200 ml , Inpharm



Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Butamiratum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Sinecod, (1,5 mg/ml), syrop - 200 ml (import równoległy - InPharm)

(Butamirati citas)

Opis produktu:

Syrop przeciwkaszlowy do stosowania w objawowym leczeniu kaszlu.

Importer: InPharm

Skład:

- **Substancja czynną** jest Butamiratu cytrynian
- **Substancje pomocnicze:** sorbitol 70% roztwór, sacharynę sodową, wanilinę, kwas benzoesowy, etanol 94%, glicerol, sodu wodorotlenek 30% roztwór w/w, wodę oczyszczoną.

Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu

Wskazania:

- Sinecod w postaci syropu stosowany jest w objawowym leczeniu kaszlu różnego pochodzenia.

Działanie:

- Butamiratu cytrynian wykazuje nieswoiste działanie przeciwocholinergiczne i rozszerzające oskrzela, co ułatwia oddychanie.
- Sinecod nie wywołuje przyzwyczajenia ani uzależnienia.
- Butamiratu cytrynian ma szeroki indeks terapeutyczny: stąd też Sinecod jest dobrze tolerowany.
- Jest stosowany w celu łagodzenia kaszlu u dorosłych i dzieci.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Sinecod dłużej niż 5 - 7 dni.

Lek należy stosować doustnie.

Do opakowania leku dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie 5 ml, 10 ml i 15 ml syropu.

Miarkę do dawkowania syropu należy umyć i wysuszyć po każdorazowym użyciu.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę;
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę
- Dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

Leku Sinecod syrop nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Rzadko** (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek) występują następujące objawy: senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

Wymienione objawy powinny ustąpić po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu stosowania leku.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych, ponieważ może to prowadzić do zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez butamiratu cytrynian, należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych.

Lek Sinecod zawiera:

- sorbitol, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- etanol (alkohol), mniej niż 100 mg na dawkę.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Podmiot odpowiedzialny/Import równoległy:

InPharm Sp. z o.o., ul. Strumykowa 28/11, 03-138 Warszawa

Podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu:

GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapeszt, Węgry

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.