

Smecta 10 saszetek lek na biegunkę Inpharm



Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Diosmectitum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Smecta 3 g, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej - 10 saszetek

smak pomarańczowo-waniliowy

(Diosmectite)

Opis produktu:

Smecta to produkt leczniczy do stosowania w leczeniu ostrej biegunki u dzieci od 2. roku życia i dorosłych oraz przewlekłej biegunki czynnościowej u dorosłych

Skład:

Substancją czynną jest:

- diosmektyt (glinokrzemian) (Diosmectite)

substancje pomocnicze:

- glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat pomarańczowy*, aromat waniliowy Aromat pomarańczowy: maltodekstryna, sacharoza, guma arabska [E 414], mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym [E 472e], dwutlenek krzemu [E 551], aromat pomarańczowy Aromat waniliowy: maltodekstryna, sacharoza, trioctan gliceryny [E 1518], dwutlenek krzemu [E 551] alkohol etylowy, lecytyna sojowa [E 322], zapach waniliowy

Wskazania:

- ostra biegunka u dzieci, niemowląt, dorosłych
- przewlekła biegunka czynnościowa u dorosłych

Działanie:

- przeciwbiegunkowe, powlekające na błonę śluzową przewodu pokarmowego
- działa ochronnie na śluzówkę poprzez izolowanie jej od działania kwasu solnego i innych substancji drażniących

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci powyżej 2. roku życia (biegunka ostra):

- 2 saszetki na dobę, na początku leczenia ostrej biegunki dawka może być podwojona

Sposób przygotowania: zawartość saszetki rozpuścić w 50 ml wody i podawać małymi porcjami w ciągu dnia. Smectę może również wymieszać z pokarmami półpłynnymi (bulion, przeciery, gotowane owoce, gotowymi daniami dla dzieci)

Dorośli (biegunka ostra):

- 3 saszetki na dobę, na początku leczenia w ostrej biegunce, dawka może być podwojona

Sposób przygotowania: zawartość saszetki rozpuścić w połowie szklanki wody

Dorośli (przewlekła biegunka czynnościowa):

- dawka dobową to 9 g, czyli 3 saszetki

Jeśli po upływie 2 do 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się długotrwałego ani częstego stosowania leku Smecta bez konsultacji z lekarzem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- zaparcia

Niezbędnie często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- wysypka

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- pokrzywka (swędząca wysypka)

Częstość nieznaną:

- reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry, świąd, obrzęk, trudności w oddychaniu, omdlenia, zapaść)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Właściwości adsorpcyjne tego leku mogą wpływać na szybkość i (lub) stopień wchłaniania innych substancji. W związku z tym nie należy podawać żadnego innego leku w tym czasie co diosmektyt. Zaleca się 2-godzinną przerwę między przyjmowaniem innych leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- przed rozpoczęciem stosowania leku Smecta należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty;
- jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję niektórych cukrów,
- jeśli u pacjenta występowały w przeszłości ciężkie zaparcia.
- podczas leczenia biegunki konieczne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Objętość podawanych roztworów i ich drogę podania należy dostosować do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz nasilenia biegunki.
- należy zapewnić nawadnianie dużą ilością słonych lub słodkich napojów, aby zrekompensować utratę płynów z powodu biegunki (średnie dzienne zapotrzebowanie na wodę u osoby dorosłej wynosi 2 litry).
- należy podtrzymać przyjmowanie pokarmów do momentu ustąpienia biegunki, ale z wyłączeniem niektórych z nich, szczególnie surowych warzyw i owoców, zielonych warzyw, dań pikantnych oraz mrożonych pokarmów lub napojów. Preferowane są grillowane mięso i ryż

Lek Smecta zawiera glukozę i sacharozę

- jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

- lek zawiera 0,679 g glukozy i 0,27 g sacharozy w jednej saszetce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą

Ciąża i karmienie piersią:

- lek Smecta może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, jednak przewiduje się brak takiego wpływu

Stosowanie u dzieci:

- nie należy stosować leku u niemowląt i dzieci w wieku do 2 lat
- u dzieci w wieku powyżej 2 lat ostra biegunka musi być leczona w połączeniu z wczesnym podawaniem doustnego płynu nawadniającego, aby uniknąć odwodnienia. Przewlekłe stosowanie leku jest niewskazane.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

IPSEN Consumer HealthCare Francja

Importer równoległy:

- InPharm Sp. z o.o. Warszawa.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.