

Solvetusan, syrop 0,06 g/10ml, leczenie suchego kaszlu, 150 ml



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------|
| Producent / Marka | Aflofarm |
| Substancja czynna | Levodropropizynum |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Solvetusan, syrop 60 mg/10 ml - 150 ml

(Levodropropizynum)

Opis produktu:

Syrop Solvetusan to lek przeciwkaszlowy. Solvetusan zawiera jako substancję czynną lewodropropizynę, która znosi także skurcz oskrzeli. Syrop stosuje się w leczeniu objawowym suchego kaszlu różnego pochodzenia, np. przy zakażeniach dróg oddechowych lub krztuścu. Solvetusan można podawać dorosłym oraz dzieciom w wieku powyżej 2 lat.

Skład:

- Substancją czynną leku jest lewodropropizyna.
- Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), aromat wiśniowy (octan etylu, octan izoamylu, benzaldehyd, alkohol benzylowy, eugenol, wanilina, etanol, glikol propylenowy), sodu wodorotlenek, roztwór 32%, woda oczyszczona.

10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.

Wskazania:

- Wskazaniem do zastosowania syropu Solvetusan jest objawowe leczenie nieproduktywnego (suchego) kaszlu

Działanie:

- Solvetusan działa przeciwkaszlowo i znosi skurcz oskrzeli.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek podaje się doustnie, odmierzając go za pomocą dołączonej miarki.
- Jeśli po 7 dniach stosowania leku kaszel utrzymuje się to należy przerwać stosowanie leku oraz skonsultować się z lekarzem. Zalecane dawkowanie Solvetusanu prezentuje tabela.
- Należy pamiętać o minimum 6 godzinnych odstępach między dawkami.

Wiek: Dawkowanie

- **Dzieci w wieku powyżej 2 lat o masie od 10 do 20 kg:** 3 ml syropu 3 razy dziennie
- **Dzieci w wieku powyżej 2 lat o masie od 21 do 30 kg:** 5 ml syropu 3 razy dziennie
- **Dorośli:** 10 ml syropu 3 razy dziennie

Przeciwwskazania:

- Nie stosować Solvetusanu u osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest obfita wydzielina oskrzelowa oraz zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).

Możliwe działania niepożądane:

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Bardzo rzadko** występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): pokrzywka, rumień, osutka, świąd, reakcje skórne; bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka; ogólne złe samopoczucie; zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie; zaburzenia pracy serca (kołatanie serca, częstoskurcz), obniżenie ciśnienia tętniczego; - drażliwość, senność, depersonalizacja (poczucie obcości samego siebie); duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego; astenia (ogólne osłabienie organizmu) i osłabienie kończyn dolnych.
- **Częstość nieznana:** zapalenie języka i aftowe zapalenie jamy ustnej z gorączką; cholestatyczne zapalenie wątroby (stan zapalny spowodowany zatrzymaniem odpływu żółci z wątroby); przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia; napady padaczki: duży napad padaczkowy (drgawki kloniczno-toniczne) oraz mały napad padaczkowy (bezdrgawkowy, tzw. napad typu petit mal); rozszerzenie źrenic oraz utrata zdolności widzenia. W obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku; senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty u noworodka, co przypisano przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny przyjmowanej przez karmiącą piersią matkę. Objawy pojawiły się po karmieniu i ustąpiły samoistnie po ominięciu kilku karmień piersią; obrzęk powiek.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Solvetusan może wchodzić w interakcje z lekami uspokajającymi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Solvetusan zawiera sacharozę, propylu parahydroksybenzoesan i metylu parahydroksybenzoesan, alkohol benzylowy, glikol propylenowy oraz alkohol etylowy. 10 ml leku posiada w składzie 4 g sacharozy, więc jeśli pacjent nie toleruje niektórych cukrów to przed zastosowaniem powinien skonsultować się z lekarzem.
- Osoby z chorobami wątroby czy nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem, ponieważ alkohol benzylowy może prowadzić do działań niepożądanych (kwasicy metabolicznej).
- Syrop zawiera propylu parahydroksybenzoesan i metylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego), takie jak kontaktowe zapalenie skóry, rzadko: reakcje natychmiastowe, jak pokrzywka czy skurcz oskrzeli. W 10 ml leku znajduje się 0,2 mg alkoholu benzylowego, mogącego wywoływać reakcje alergiczne. 10 ml leku zawiera 4 mg alkoholu etylowego i 13 mg glikolu propylenowego.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

- Zaleca się stosować syrop między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie stosować syropu Salvetusan w czasie ciąży oraz karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie podawać syropu dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- W rzadkich przypadkach lek może powodować senność (patrz również pkt. 4 Działania niepożądane), należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy lub obsługiwać urządzenia mechaniczne i poinformować ich o takiej ewentualności.

Przechowywanie:

- Po pierwszym otwarciu produkt można stosować przez 12 miesięcy.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.