

Sora Forte, 10 mg/ml szampon leczniczy, 50 ml



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Permethrinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Sora Forte 10 mg/ml szampon leczniczy - 50 ml

(Permethrinum)

Opis produktu:

Sora Forte to produkt leczniczy do stosowania we wszawicy głowowej.

Skład:

- **Substancja czynna** - permetryna
- **substancje pomocnicze** - sodu siarczan laurylowy oksyetylenowany, betaina kokamidopropylowa, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, diazolidynomocznik, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glikolu etylenowego distearynian, monoetanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol laurylowy oksyetylenowany 10, olej rycynowy uwodorniony, alkohol laurylowy oksyetylenowany 2, kompozycja zapachowa, woda oczyszczona.

1 ml szamponu zawiera 10 mg permetryny.

Wskazania:

- Wszawica głowowa u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat.
- Lecznico we wszawicy głowowej w celu usunięcia pasożytów
- Profilaktycznie u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej.

Działanie:

- Sora Forte wykazuje działanie przeciwpasożytnicze przeciw wszy głowowej.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Przed użyciem produktu należy kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem.
- Szampon należy nałożyć na mokre włosy i rozprowadzić go równomiernie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy.
- Włosy należy masować aż do uzyskania obfitej piany.
- Uzyskaną pianę należy pozostawić na 10 minut (w celu zwiększenia skuteczności zabiegu można nałożyć jednorazowy czepek na włosy pokryte szamponem).
- Następnie dokładnie spłukać włosy wodą i starannie wyczesać załączonym do opakowania grzebieniem, w celu usunięcia martwych wszy i ich jaj (gnid).
- Po upływie 10 dni od pierwszego użycia kurację należy powtórzyć.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Częstość nieznaną:

- przemijające, niewielkie odczyny skórne (pieczenie, swędzenie),
- rumień, wysypka,
- podrażnienie skóry, przeczulica skóry,
- uczucie porażenia ciała (dla osób często stosujących lek).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek zawiera glikol propylenowy - może podrażniać skórę.
- Lek zawiera pochodne parahydroksybenzoesanu - mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje późnego typu).
- Lek wyłącznie do stosowania zewnętrznego, stosować wyłącznie na włosy głowy.
- Nie stosować na brwi, rzęsy oraz we wszawicy łonowej.
- Nie stosować u osób z objawami nadwrażliwości.
- Lek może powodować podrażnienie oczu i błon śluzowych.
- U osób często stosujących lek, zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci:

- Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.