

Starazolin Alergia, krople do oczu, 5 ml



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Polfa Warszawa

Substancja
czynna Olopatadinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Starazolin alergia, krople do oczu 1 mg/ ml - 5 ml

(Olopatadinum)

Opis produktu:

Lek Starazolin Alergia jest przeznaczony do leczenia objawów ocznych (świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i spojówek) u pacjentów z rozpoznaniem sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.

Lek może być stosowany tylko u osób dorosłych.

Skład:

Substancją czynną jest - olopatadyna.

Substancje pomocnicze - sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, polisorbit 80, kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

1 ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodoru).

Wskazania:

- Leczenie ocznych objawów sezonowego zapalenia spojówek,
- łzawienie,
- świąd
- zaczerwienienie oczu,
- obrzęk spojówek oraz powiek.
- lek jest przeznaczony dla osób dorosłych ze zdiagnozowanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.

Działanie:

- Krople do oczu Starazolin Alergia zawierają olopatadynę, czyli substancję przeciwdziałającą histaminie (podstawowemu mediatorowi odpowiedzi alergicznej u ludzi).
- Alergiczne zapalenie spojówek może towarzyszyć również wodnisty katar czy kichanie, które Starazolin Alergia także ogranicza.
- Lek zmniejsza nasilenie reakcji uczuleniowej.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie Starazolin Alergia u osób dorosłych: to 1 kropla do oka/oczu 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami leku wynosi co najmniej 8 godzin.

- Krople podawać do worka spojówkowego.
- W przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy wyjąć je przed aplikacją leku i odczekać min. 15 minut przed ich założeniem.
- Czas leczenia wynosi do dwóch tygodni.
- W razie braku poprawy lub pogorszenia się objawów w ciągu 3 dni od rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.
- O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy po konsultacji lekarskiej.
- Nie należy stosować leku dłużej niż 4 miesiące.

Przeciwwskazania:

Nie stosować kropli Starazolin Alergia u osób uczulonych na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):** ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka; bóle głowy, nieprzyjemny smak w ustach, suchość błony śluzowej nosa, zmęczenie.
- **Niezbyt często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):** zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia, wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, niewyraźne lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku, świąd oka, zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, zaczerwienienie lub obrzęk powiek, nieprawidłowości w obrębie powiek, zaczerwienienie oka; zapalenie błony śluzowej nosa, zawroty głowy, nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zapalenie skóry (kontaktowe), uczucie pieczenia skóry, suchość skóry.
- **Częstość nieznaną:** obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zmiana wielkości źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek; nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, duszność, zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry i jej zaczerwienienie, ogólne osłabienie, złe samopoczucie.

U pacjentów ze znacznie uszkodzoną przednią, przezroczystą warstwą oka (rogówką), bardzo rzadko obserwowano mętne plamy na rogówce spowodowane przez odkładanie się wapnia w trakcie leczenia.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy stosować leku Starazolin Alergia w czasie ciąży ani podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Przez pewien czas po zakropleniu leku Starazolin Alergia widzenie może być niewyraźne. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn aż do poprawy stanu widzenia.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 90 dni. Po tym czasie butelkę należy wyrzucić i zacząć używać następną butelkę leku. Datę otwarcia butelki należy zapisać na pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.