

Steper PRO, krem, na, grzybicę, stóp, dłoni, 0,01 g/g 15 g,15 g



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Bifonazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Steper pro 10 mg/g krem 15 g

(Bifonazolum)

Opis produktu:

Produkt leczniczy **Steper pro** to krem o szerokim działaniu przeciwgrzybiczym.

Skład:

- **Substancja czynna** - bifonazol (bifonazolum)
- **Substancje pomocnicze** -alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, olejek eteryczny z mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, woda oczyszczona

1 gram kremu zawiera 10 mg bifonazolu.

Wskazania:

- **Steper pro** stosowany jest w grzybicach skóry i łupieżu rumieniowatym.

Działanie:

- Substancja czynna leku **Steper pro** ma działanie grzybobójcze na dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

- Należy stosować **raz na dobę**, najlepiej wieczorem, przed snem
- Należy nanieść **cienką warstwę leku na obszar objęty zmianami** chorobowymi i delikatnie **wmasować**.
- Leczenie lekiem Steper pro należy prowadzić przez odpowiednio długi okres.

Zwykle lek stosuje się tak jak przedstawiono poniżej:

- **Wskazania:** Okres leczenia
- **Grzybice stóp, w tym grzybica międzypalcowa:** 3 tygodnie
- **Grzybica tułowia, dłoni i fałdów skórnych:** 2 – 3 tygodnie
- **Łupież pstry:** 2 tygodnie
- **Łupież rumieniowaty:** 2 tygodnie
- **Grzybica (kandydoza) powierzchowna skóry:** 2 – 4 tygodnie

Przeciwwskazania:

- Nie stosować leku **Steper pro** jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną leku lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania nieznana:

- ból w miejscu podania;
- obrzęk obrzeżny w miejscu podania;
- kontaktowe zapalenie skóry;alergiczne zapalenie skóry;
- miejscowe zaczerwienienie skóry;
- świąd;
- wysypka;
- pokrzywka;

- pęcherzyki;
- łuszczenie skóry;
- wyprysk;
- suchość skóry;
- podrażnienie skóry;
- rozmiękanie skóry pod wpływem działania leku;
- uczucie pieczenia na skórze.

Objawy niepożądane zwykle ustępują po zakończeniu leczenia.

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Możliwa jest interakcja pomiędzy stosowanym miejscowo bifonazolem i warfaryną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki załączoną do opakowania.

Przed rozpoczęciem stosowania **Steper pro**, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne leki przeciwgrzybicze np. ekonazol, klotrymazol, mikonazol, powinni ostrożnie stosować leki zawierające bifonazol.
- Jeżeli objawy choroby utrzymują się lub nie ustępują po przerwaniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami.
- Nie połykać.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące

Dzieci i młodzież:

- Lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy stosować leku **Steper pro** w pierwszym trymestrze ciąży.
- Jeśli lekarz zdecyduje o konieczności zastosowania leku **Steper pro** w okresie karmienia piersią, należy przerwać karmienie piersią.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
- Nie zamrażać
- Okres ważności

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., Partyzancka, Pabianice

Masa netto: 15g

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.